

## Flash n°2

Date de publication  
14 mai 2025



## Cultures légumières, allium et pomme de terre



### Flash Modélisation Mildiou

#### De la pomme de terre

#### Secteur Auvergne Rhône Alpes

Ce flash a pour vocation de compléter les parutions BSV toutes les 2 semaines, pour proposer une modélisation actualisée.

Il mobilise le Modèle Mileos® qui se base sur le cycle épidémique de *Phytophtora infestans*.

##### Stations météo :

- Secteur **AUVERGNE** : Pont-du-Château, Lamontgrie, Thuret, Montpensier pour le 63, Charmes pour le 03 et Craponne sur Arzon pour le 43
- Secteur **RHONE-ALPES\*** : Lucenay et Chabanière (69), St Prim, les éparres (38), Annecy (74), Cruas (07), St Just St Rambert (42), Bren, St Marcel lès Valence, Margès, Marsaz, Claveyson (26), St Bénigne et St Denis Lès Bourg (01).


\*Certaines stations météo sont amenées à évoluer en fonction de la disponibilité des données permettant de faire tourner le modèle MILEOS®.



## Légende

	Risque faible
	Vigilance
	Seuil nuisibilité atteint variété sensible
	Seuil nuisibilité atteint variété intermédiaire
	Seuil nuisibilité atteint variété résistante

## Carte des Cas-types 2025 – 14/05/2025



# **SECTEUR AUVERGNE**

## **Risque immédiat**

### **Risque faible :**

Le climat n'est pas favorable au mildiou et / ou la quantité de spores présente dans l'environnement n'est pas suffisante. Le risque mildiou est faible actuellement.

Situation épidémiologique modélisée : Modèle Mileos® (Arvalis-Institut du Végétal)

Stations météo	Niveau de risque au 14/05	Seuil de nuisibilité atteint			Pluviométrie	
		VS	VI	VR	J-7 à J-1	J à J+7
Pont du Château		Non	Non	Non	20.5	5.7
Thuret		Non	Non	Non	23.5	9.3
Montpensier		Non	Non	Non	11.8	11.4
Lamontgie		Non	Non	Non	13.9	6.0
Charmes		Non	Non	Non	11.7	13.2
Craponne-sur-Arzon		Non	Non	Non	9.3	17.9

\* : VS : variété sensible – VI : variété intermédiaire – VR : variété résistante

Attention, l'information donnée par Mileos® n'est valable que pour la date et l'heure indiquées.

## **Prévision d'évolution du risque pour les jours suivants**

### **Risque faible à élevé sur variétés sensibles :**

Trois secteurs restent en risque élevé sur variétés sensibles à date du 21 mai 2025. Risque faible sur les autres secteurs.

Stations météo	Niveau de risque à J+7	Seuil de nuisibilité prévisionnel atteint		
		VS	VI	VR
Pont du Château	Oui 21/05/2025	Non	Non	
Thuret	Oui 21/05/2025	Non	Non	
Montpensier	Non	Non	Non	
Lamontgie	Oui 21/05/2025	Non	Non	
Charmes	Non	Non	Non	
Craponne sur Arzon	Non	Non	Non	

\* : VS : variété sensible – VI : variété intermédiaire – VR : variété résistante

Attention, l'information donnée par Mileos® n'est valable que pour la date et l'heure indiquées.

# SECTEUR RHONE-ALPES

## Risque immédiat

### Risque faible à élevé sur variété intermédiaire :

Stations météo	Niveau de risque au 14/05	Seuil de nuisibilité atteint			Pluviométrie	
		VS	VI	VR	J-7 à J-1	J à J+7
Cruas		Non	Non	Non	8.2	27.3
Annecy		Non	Non	Non	21.2	15.3
Chabanière		Non	Non	Non	5.0	12.3
St Just St Rambert		Non	Non	Non	13.4	10.5
Les éparres		Non	Non	Non	17.1	15.6
Bren		Non	Non	Non	9.3	14.4
St Marcel lès Valence		Non	Non	Non	10.1	18.0
St Bénigne		Non	Non	Non	13.9	11.7
St Denis lès Bourg		Non	Non	Non	22.8	13.2
Lucenay		Non	Non	Non	8.0	10.2
Margès		Non	Non	Non	4.8	18.0
Marsaz		Non	Non	Non	7.8	14.7
Claveyson		Non	Non	Non	9.4	14.7

\* : VS : variété sensible – VI : variété intermédiaire – VR : variété résistante

Attention, l'information donnée par Mileos® n'est valable que pour la date et l'heure indiquées.

## Prévision d'évolution du risque pour les jours suivants

### Risque faible à élevé sur variétés résistantes :

Augmentation des cumuls de précipitations à venir dans les prochains jours associés à une hausse du potentiel de sporulation et de l'index de contamination. Nombreux secteurs à risque mildiou, sur variétés sensibles, intermédiaires et résistantes.

Stations météo	Niveau de risque à J+7	Seuil de nuisibilité prévisionnel atteint		
		VS	VI	VR
Cruas		Oui 21/05	Oui 21/05	Oui 21/05
Annecy		Oui 21/05	Non	Non
Chabanière		Oui 21/05	Non	Non
St Just St Rambert		Oui 21/05	Non	Non
Les éparres		Oui 21/05	Non	Non
Bren		Oui 21/05	Non	Non
St Marcel lès Valence		Oui 21/05	Non	Non
St Bénigne		Oui 21/05	Oui 21/05	Non
St Denis lès Bourg		Oui 21/05	Non	Non
Lucenay		Oui 21/05	Non	Non
Margès		Oui 21/05	Non	Non
Marsaz		Oui 21/05	Oui 21/05	Oui 21/05
Claveyson		Non	Non	Non

## **A SAVOIR**

- Si la T°C > 30°C, le cycle est très ralenti.
- Après une période humide, le brouillard du matin est très favorable au mildiou. L'arrosage se fait plutôt le matin pour ne pas créer d'humidité SAUF en période très sèche et chaude où il peut être fait le soir.
- Le rayon de « validité » du modèle est de 10 km autour de la localisation GPS des données météo.
- La contamination début de cycle est au stade 3-4 feuilles et en fin de cycle, même après défanage, la contamination reste possible si les buttes ne sont pas refermées.

## **CONSEIL ALTERNATIF OU BIOCONTROLE**

### Les mesures prophylactiques :

- Choix de variétés résistantes.
- Elimination des repousses dans les cultures situées à proximité (potentiellement à plus de 1 km) et des tas de déchets qui sont sources de contaminations.
- Bon appuyage des buttes pour éviter la contamination des tubercules.
- A la récolte, ramassage du maximum de tubercules (y compris les petits) dans les parcelles, pour ne pas laisser un inoculum pour l'année suivante.

**Aucun moyen de lutte directe biocontrôle**



Pour en savoir plus, Ecophytopic, le portail de la protection intégrée.  
<https://ecophytopic.fr/search/ecophytopic?keys=pomme+de+terre&items>

*Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation*

**Directeur de publication :** Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

**Coordonnées du référent :** Perrine VAURE (CRAAURA) [perrine.vaure@aura.chambagri.fr](mailto:perrine.vaure@aura.chambagri.fr) - 06 76 24 46 48

**Animateur filière/Rédacteurs :**

Julie DENUELLE – CA63 - [j.denuelle@puy-de-dome.chambagri.fr](mailto:j.denuelle@puy-de-dome.chambagri.fr) - 06 89 01 28 22

Mélodie PIERRAT – CA01 – [melodie.pierrat@ain.chambagri.fr](mailto:melodie.pierrat@ain.chambagri.fr) – 06 78 82 07 68

**À partir d'observations réalisées par :** les Chambres d'Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, Coopérative Agricole Bresse Mâconnais, FREDON Auvergne Rhône Alpes, Xpert Agro, ADABIO, lycée Horticole de Romans, groupe Oxyane.

*Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tout autre lecteur doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.*

*Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.*

