

BSV n° 7
17 juin 2026

Viticulture

À retenir cette semaine

Peu d'évolution cette semaine. Globalement, les vignobles d'Auvergne sont sains.

Black Rot

Le risque reste faible.

Mildiou

Compte tenu de la météo ensoleillée, chaude et sans pluie annoncée, le risque est faible.

Oïdium

Au vu de la météo, le risque est faible

Pour cette campagne 2026, la rédaction et l'animation du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) Vigne sont temporairement assurées par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec les partenaires techniques et professionnels du territoire. Cette organisation exceptionnelle vise à maintenir un suivi rigoureux des bioagresseurs majeurs (mildiou, oïdium, black rot, tordeuses de la grappe et cicadelle de la flavescence dorée), sur la base du réseau d'observations existant.

Données du réseau

		Nombre parcelles	Stades phénologiques
Puy de dôme	Gamay	3 (dont 1 en AB)	Nouaison à grains de pois, majorité à grains de plomb
	Pinot	2	
Allier	Sauvignon	1 en AB	
	Pinot	1	
	Gamay	1	

Données météorologiques de la semaine passée

(mercredi 3/06 au mardi 09/06)

	Température °C		Pluviométrie (mm)
	MIN	MAX	
Charmes	10.5	33.6	0
Chareil-Cintrat	9.8	34.6	0
Plauzat	8.7	32.6	0
Sayat	9.7	32.2	0
Clermont-Ferrand	8	33.5	0

Prévisions (sources Prévi+)

Jeudi et vendredi temps ensoleillé dominant 35 à 38 °C en plaine, peu d'évolution samedi. Dès dimanche, aggravation de la chaleur en plaine pendant plusieurs jours avec des températures entre 35 et 40°C.

Credit photo : Réseau des Chambres d' Agriculture



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



Notes nationales biodiversité et réglementation

Ces notes illustrées, pédagogiques, et enrichies de témoignages de professionnels constituent un outil important dans la perspective globale du changement des pratiques agricoles



Protection des pollinisateurs : REGLEMENTATION

IMPORTANT : L'annexe à l'arrêté du 20 novembre 2021 portant définition des cultures non attractives a été annulée par le Conseil d'Etat.

La culture de la vigne est maintenant concernée par la réglementation sur la protection des pollinisateurs.

Depuis le 1^{er} janvier 2022, les conditions d'autorisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison pour certaines cultures ainsi que l'étiquetage de ces produits sont encadrés par l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces conditions visent aussi bien les insecticides et acaricides que les fongicides et herbicides, ainsi que les adjuvants. [ICI](#)

NOTE TECHNIQUE NATIONALE résistances

Les champignons responsables du Mildiou, de l'Oïdium, du Black rot et du Botrytis sur vigne sont exposés à des risques de résistance vis-à-vis de plusieurs familles de produits phytosanitaires. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la note commune de gestion de la résistance 2026.



Lien vers la note mise à jour en janvier 2026 : <https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2026-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne>



[Lien vers le site R4P \(état des lieux des résistances\) : ICI](#)

[Tout savoir sur le biocontrôle en viticulture](#)



Tout sur les ravageurs de la vigne : [ICI](#)

Situation sanitaire

Mildiou


Plus d'informations : <https://ecophytopic.fr/abaa/piloter/mildiou-de-la-vigne>

Source : EPHYTIA

Données de la modélisation

RIMpro est un modèle complet qui calcule :

- la dynamique des oospores : leur libération en fonction de la température et de la pluviométrie
- le risque d'infections primaires et secondaires
- le potentiel de sporulation
- les périodes à risque



La **pluviométrie** se visualise en dessous du graphique inférieur en bleu foncé. Le **graphique inférieur** montre les différentes étapes de la maturation des oospores et de la production des zoospores. Le **graphique du milieu** montre le risque d'infection. Il se matérialise par « les pics et colonnes » en rouge. Le graphique d'infection ne fait pas la distinction entre une source primaire ou secondaire de zoospores.

Aucun symptôme sur feuilles et sur grappes n'a été observé.

Compte tenu de la météo ensoleillée, chaude et sans pluie annoncée, le risque est désormais faible.



Oïdium

Les conditions météorologiques prévues sont globalement peu favorables à de nouvelles contaminations, notamment à partir de ce week-end, avec l'installation d'un épisode caniculaire. Le risque est donc faible sur les parcelles sans symptômes


Facteurs influençant le développement du champignon : [ICI](#)



Black rot

Biologie : [ICI](#)

La situation reste globalement saine, avec seulement quelques taches observées de façon très ponctuelle sur les parcelles historiquement sensibles.



Tordeuses de la grappe

Les vols de la première génération d'Eudémis sont terminés. Des glomérules sont observées dans un vignoble de l'Allier.

Fiche technique Vers de la grappe et piégeage (BSV Nouvelle Aquitaine) : [ICI](#)

	Nombre captures Semaine 23	Nombre captures semaine 23
VEYRE-MONTON	0	0
BILLOM	0	0
CHATEAUGAY	0	0
SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER	0	0
VASSEL	0	0
BOUDES	0	0

Observations du réseau :

Présence d'érinose, excoriose et dégâts de mange-bourgeons notés dans des parcelles du Puy de Dome.

Larves de cicadelles vertes (*Empoasca vitis*) observées (seuil de risque 100 larves/100 feuilles) et toujours une dynamique d'insectes auxiliaires observés (larve coccinelles,syrphes, chrysoptes) dans quelques parcelles.

Les fortes chaleurs annoncées pour les prochains jours pourront accentuer les situations de déficit hydrique. Les premiers symptômes de stress hydrique observés la semaine dernière sur certains plants pourraient ainsi s'intensifier et s'étendre aux parcelles les plus sensibles, notamment sur les sols superficiels.

Un ralentissement voire un arrêt temporaire de la croissance végétative pourra être observé. Les températures exceptionnellement élevées attendues pourraient également favoriser l'apparition de symptômes d'échaudage sur les grappes les plus exposées au rayonnement solaire

MIEUX CONNAITRE

Les engrais verts en viticulture : [ICI](#)

Adaptation au stress hydrique
et thermique en viticulture : [ICI](#)

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine VAURE - perrine.vaure@aura.chambagri.fr

Animateur filière/Rédacteur : DRAAF-SRAL AURA

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le syndicat des viticulteurs de Saint-Pourçain, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint-Pourcinois et des Côtes d'Auvergne.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la Biodiversité

