

BSV n° 8
8 juillet 2026

Viticulture

À retenir cette semaine

Black Rot

Forte baisse de sensibilité des grappes à partir du stade fermeture et météo très chaude et sèche, le risque est faible.

Mildiou

Compte tenu de la météo ensoleillée, chaude et sans pluie annoncée, le risque est faible.

Oidium

Au stade fermeture de la grappe, la sensibilité des grappes diminue

Pour cette campagne 2026, la rédaction et l'animation du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) Vigne sont temporairement assurées par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec les partenaires techniques et professionnels du territoire. Cette organisation exceptionnelle vise à maintenir un suivi rigoureux des bioagresseurs majeurs (mildiou, oïdium, black rot, tordeuses de la grappe et cicadelle de la flavescence dorée), sur la base du réseau d'observations existant.

Données du réseau

		Nombre parcelles	Stades phénologiques
Puy de dôme	Gamay	3 (dont 1 en AB)	Grains de pois à fermeture de la grappe. Hors réseau plusieurs parcelles de pinot et gamay (63) en cours de véraison.
	Pinot	3 (dont en AB)	
	Chardonnay	1	
Allier	Sauvignon	1 en AB	
	Pinot	1	

Données météorologiques de la semaine passée


(mercredi 1/07 au mardi 07/07)

	Température °C		Pluviométrie (mm)
	MIN	MAX	
Charmes	14.7	37.6	0
Chareil-Cintrat	12.6	37.8	0
Plauzat	13.5	35.8	0
Sayat	14.1	35.6	0
Clermont-Ferrand	13.4	36.4	0

Prévisions (sources Prévi+)

Poursuite d'une temps très chaud avec maximales > 35°C en plaine au minimum jusqu'à mi-juillet
Risque ponctuel d'orages à partir du 10/07.

Credit photo : Réseau des Chambres d' Agriculture



Notes nationales biodiversité et réglementation

Ces notes illustrées, pédagogiques, et enrichies de témoignages de professionnels constituent un outil important dans la perspective globale du changement des pratiques agricoles



Protection des pollinisateurs : REGLEMENTATION

IMPORTANT : L'annexe à l'arrêté du 20 novembre 2021 portant définition des cultures non attractives a été annulée par le Conseil d'Etat.

La culture de la vigne est maintenant concernée par la réglementation sur la protection des pollinisateurs.

Depuis le 1^{er} janvier 2022, les conditions d'autorisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison pour certaines cultures ainsi que l'étiquetage de ces produits sont encadrés par l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces conditions visent aussi bien les insecticides et acaricides que les fongicides et herbicides, ainsi que les adjuvants. [ICI](#)

NOTE TECHNIQUE NATIONALE résistances

Les champignons responsables du Mildiou, de l'Oïdium, du Black rot et du Botrytis sur vigne sont exposés à des risques de résistance vis-à-vis de plusieurs familles de produits phytosanitaires. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la note commune de gestion de la résistance 2026.



Lien vers la note mise à jour en janvier 2026 : <https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2026-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne>



[Lien vers le site R4P \(état des lieux des résistances\) : ICI](#)

[Tout savoir sur le biocontrôle en viticulture](#)



Tout sur les ravageurs de la vigne : [ICI](#)

Situation sanitaire

Mildiou


Plus d'informations : <https://ecophytopic.fr/abaa/piloter/mildiou-de-la-vigne>

Source : EPHYTIA

Données de la modélisation


RIMpro est un modèle complet qui calcule :

- la dynamique des oospores : leur libération en fonction de la température et de la pluviométrie
- le risque d'infections primaires et secondaires
- le potentiel de sporulation
- les périodes à risque



La **pluviométrie** se visualise en dessous du graphique inférieur en bleu foncé. Le **graphique inférieur** montre les différentes étapes de la maturation des oospores et de la production des zoospores. Le **graphique du milieu** montre le risque d'infection. Il se matérialise par « les pics et colonnes » en rouge. Le graphique d'infection ne fait pas la distinction entre une source primaire ou secondaire de zoospores.

En l'absence de symptômes observés et au vu de la météo annoncée, **le risque est nul**.




Oïdium

Aucune évolution de la maladie dans le réseau.

Au stade fermeture de la grappe, la sensibilité des grappes diminue : **le risque est nul**


Facteurs influençant le développement du champignon : [ICI](#)



Black rot

Biologie : [ICI](#)

Compte tenu de la météo et de la forte baisse de sensibilité des grappes à partir du stade fermeture, le risque est nul.



Tordeuses de la grappe

Les vols de la deuxième génération d'Eudémis continuent faiblement avec peu de captures. Fiche technique Vers de la grappe et piégeage (BSV Nouvelle Aquitaine) : [ICI](#)

	Nombre captures Semaine 27	Nombre captures semaine 28
VEYRE-MONTON	20	0
BILLOM	0	2
CHATEAUGAY	2	0
SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER	10	1
VASSEL	15	2
BOUDES	0	0
St POUÇAIN SUR SIOULE	0	1

Observations du réseau :

Stress hydrique important, nombreuses feuilles et grappes brûlées (coulure).

MIEUX CONNAITRE

La stimulation des défenses de la vigne : La stimulation des défenses des plantes est une stratégie originale de protection des cultures. Les Stimulateurs des défenses des plantes (SDP) agissent sur la vigne pour activer ses propres mécanismes de défense et la protéger contre les maladies : [ICI](#)

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine VAURE - perrine.vaure@aura.chambagri.fr

Animateur filière/Rédacteur : DRAAF-SRAL AURA

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le syndicat des viticulteurs de Saint-Pourçain, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint-Pourcinois et des Côtes d'Auvergne.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la Biodiversité

