

N°1

Date de publication
16/072026

Date d'observation
16/07/2026

Flash suivis foreurs du maïs

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



À retenir cette semaine



Maïs :

Ce Flash Foreurs Maïs vient en complément du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) Grandes Cultures. Il a pour objectif de suivre spécifiquement l'évolution des principaux ravageurs foreurs du maïs au cours de la campagne et de fournir des informations actualisées et localisées.

Sont particulièrement ciblés :

- ❖ La pyrale du maïs (*Ostrinia nubilalis*),
- ❖ La sésamie (*Sesamia nonagrioides*),
- ❖ *Heliothis/Helicoverpa* (*Helicoverpa armigera*),

❖ Ce qu'il faut retenir :

- ❖ La majorité des maïs aussi bien semences que conso sont en cours ou arrivent à floraison.
- ❖ Vol G2 pyrales : vol en cours sur la Drôme, arrivée prochainement sur le reste du territoire. Le pic n'est pas encore atteint.
- ❖ Sésamies : captures en hausse sur la Drôme. Les captures pourraient s'intensifier sur les autres secteurs avec les températures qui restent chaudes mais plus clémentes et le retour de l'humidité apportée par les orages.
- ❖ Héliothis : vols en cours sur l'ensemble du réseau.



Pyrales

Semaine	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Pyrales nb papillons Phéromone									
Drôme	CHABEUIL	0	7	32	8	5	4	5	9
	ÉTOILE-SUR-RHÔNE	0	2	10	25	4	5	2	8
	EYMEUX 2	0	1	1	0	8	3	3	0
	EYMEUX 1	0	0	0	0	0	2	0	2
	GRANE (devant boyer)	4	8		4				1
	GRANE (Lemot)				1	9		2	3
	BONLIEU-SUR-ROUBION		0		1		1	0	0
	CREST					0	0		0
	ROCHEBAUDIN	0		2	1		3	0	0
	MONTVENDRE			0	0	0	0	0	0
	PIERRELATTE			0	0	0	0	0	0
	SAINT-JEAN-DE-GALAURE					0	0	0	4
	SAUZET					0	0	0	0
Isère	BEAUCROISSANT		1	1	1	1		0	0
	BEAUREPAIRE	1	1		10	32	1	29	7
	BOURGAIN-JALLIEU	0	0	0	15	23	6	0	0
	FRONTONAS	1	0	3	6	3	2	0	0
	JANNEYRIAS (maïs grain)	1	0	4	0	2	0	0	0
	ORNACIEUX-BALBINS	1	0	2	6	3	14	0	0
	SATOLAS-ET-BONCE	1	0	2	5	4	0	0	0
	THODURE	0	0	8	11	8	14	7	3
	JANNEYRIAS (maïs semence)				4	0	2	0	1
	SAINT-ROMANS				0	0	0	0	0
Rhône	SARDIEU				3	0	9	0	6
	AMBÉRIEUX	7	5	0		3	0	0	0
	QUINCIEUX	0	1	0		3	0	0	1
	CHAPONNAY	0	5	0	8	2	6	2	1
	COMMUNAY	0	0	0	3	10	0	1	0
	PUSIGNAN	0		54	34	3	0	0	0
Ain	SAINT-BONNET-DE-MURE	0	0	2	0	1	0	0	0
	VALSERHÔNE (piège phéromones)					0			
	VALSERHÔNE (piège lumineux)					0			
	BIRIEUX	0		3	1	3	7	8	2
	BOURG-EN-BRESSE	0	2	2	0		3	1	0
	LOYETTES	4	7	27	36	8	0	0	0
	PÉROUGES (maïs pérouges)	0		10	20	10	0	3	0
	PÉROUGES (BSV maïs BSC)	1	11	5	11		4	0	1
	SAINT-CYR-SUR-MENTHON	3	15	2	49	7	9	0	2
	SAINT-JEAN-SUR-VEYLE	0		0	1	0	0	0	0
	SAINT-JUST	1	2	13	9	4	2	1	3
	VILLENEUVE	0	3	3	4		2	0	1
Savoie	VILLENEUVE	0		1		1			
	SAINT-HELENE-DU-LAC				5	1		14	1
Ardèche	SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS					0	1	1	1

Les captures sont en hausse sur les secteurs chauds (Drôme, Plaine), confirmant l'arrivée du vol de G2. Sur les autres secteurs, le vol devrait arriver prochainement. Le pic n'a pas encore été atteint. Les fortes températures et le temps très sec n'ont pas été favorables aux vols. Les conditions seront plus propices ces prochains jours avec la baisse des températures et l'arrivée des orages. 6 parcelles observent des attaques sur pieds de l'ordre de 5 à 10%.


Les pyrales G2 favoriseront les maïs les moins avancés pour déposer leur ponte.

Analyse de risque




« Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent. » La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable sur : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>


**Evolution pluriannuelle des captures des Pyrales (phéromones)
Limons de la Bresse, de la Dombes et du Forez, Combes de Savoie**



**Evolution pluriannuelle des captures des Pyrales (phéromones)
Graviers et sables du Rhône de l'Ain et de l'Isère**



**Evolution pluriannuelle des captures des Pyrales (phéromones)
Limons, Graviers et sables superficiels de la Drome**



Sésamies

Le vol de G2 se confirme avec une augmentation importante des captures sur le secteur de la Drôme. Le reste du territoire pourrait avoir une hausse des captures prochainement avec les températures qui seront plus douces et le retour de l'humidité apportée par les orages qui seront plus favorables à l'activité.

	Semaine	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Sésamies nb papillons Phéromone									
Drôme	CHABEUIL	0	9	9	3	1	2		52	76
	BONLIEU		0							
	ÉTOILE-SUR-RHÔNE	1	3	11	10	12	4	0		4
	EYMEUX 2	3	1	0	0	0	0	0	0	
	EYMEUX 1	2	0	0	0	0	0	0	0	
	GRANE (devant boyer)	0	1		0			0		0
	GRANE (Lemot)				0	0		1		0
	ROCHEBAUDIN	0	0	0	0		0	0	0	0
	BONLIEU-SUR-ROUBION			0	0		0	0	0	0
	BEAUVALLON			0	1	3	0	0	0	0
	PIERRELATTE			0	1	0	0	0	0	0
	ROYNAC				0	0	0	0	0	11
Isère	BEAUCROISSANT			0	0	0			0	3
	BEAUREPAIRE	0	0		0	0	0		1	0
	BOURGAIN-JALLIEU	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	FRONTONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JANNEYRIAS	0		0	0	0	0	0	0	0
	ORNACIEUX-BALBINS	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SATOLAS-ET-BONCE	0		0	0	0	0	0	0	
	THODURE	1		7	3	2	1	0	0	0
Rhône	AMBÉRIEUX	0		0		0	0	0	0	0
	CHAPONNAY		0	0						1
	COMMUNAY	1	0	0	0	1	0	4		0
	QUINCIEUX		0	0		1				
	PUSIGNAN	0	9	38	7	3	1	0		3
Ain	VALSERHÔNE (piège phéromones)					0				
	VALSERHÔNE (piège lumineux)					0				
	BIRIEUX	0		1	0	1	0	0	0	1
	BOURG-EN-BRESSE	0	0	1	1	0	0	1	0	
	LENT		0							
	LOYETTES	0	0	0	0	0	0	0		0
	PÉROUGES (BSV maïs BSC - pièg	2		2	6	1	1	0	0	0
	PÉROUGES (BSV maïs BSC - pièg	3	5	0	1		0	1		0
	SAINT-CYR-SUR-MENTHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SAINT-JEAN-SUR-VEYLE	0		0	0	0	0	0	0	0
	SAINT-JUST	0	0	0	0	0	1	1	0	
Savoie	VILLENEUVE (piège phéromones)	0	0	3	1	1		0		0
	VILLENEUVE (piège lumineux)	1	0	2	2	3				
	SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC								0	

Reconnaissance des symptômes :

Deuxième génération :

Sur tige, pédoncule et épi : présence de galerie et de sciure,

Une plus forte proportion de larves demeure en bas de tige.

Ne pas confondre

Pyrale (avec dégâts 2ème
génération de sésamie)

Larve plus petite et grise






Titre : Sésamie

Description : En fin de saison, les larves de 2ème génération se réfugient dans le collet des plantes.

- Des solutions préventives peuvent être mises en place après la récolte en broyant les résidus et les collets. Les températures négatives au sol détruisent les larves présentes dans les cannes de maïs et limitent ainsi l'extension de la sésamie.
- Les mesures prophylactiques réalisées à l'échelle du bassin de parcelles sont plus efficaces qu'une lutte individuelle.

Analyse de risque





Héliothis :

Semaine	23	24	25	26	27	28	29
Héliothis nb papillons Phéromone							
Drôme	EYMEUX 2	0	2	0	2	2	2
	EYMEUX 1	0	0	4	4	0	0
	GRANE (devant boyer)		0			5	12
	GRANE (Lemot)		2	2		8	6
	ROCHEBAUDIN	0	0		0	5	4
	BEAUVALLON		2	11	0	14	119
	BONLIEU-SUR-ROUBION		0		1	0	4
	CHABRILLAN		2	11	5	33	134
	LA COURCOUDE		7	15	1	26	91
	MARSANNE			3	2	15	34
	PIERRELATTE		8	9	0	19	40
	SAINT-JEAN-DE-GALAURE			4	0	7	22
	PORTES-EN-VALDAINE				1	0	8
	SAUZET		8	10	4	24	280
Isère	BEAUCROISSANT	1	0	0			2
	BEAUREPAIRE		0	0	3		2
	BOURGOIN-JALLIEU	0	0	0	0	2	6
	FRONTOMAS	0	0	0	1	0	0
	JANNEYRIAS	2	1	2	5	16	35
	ORNACIEUX-BALBINS		0	0	0	3	1
	PISIEU		0	6	3	63	56
	THODURE		2	2	1	3	14
Rhône	AMBERIEUX					0	
	QUINCIEUX	4		0	0	17	7
	CHAPONNAY	1	2	0	0	2	2
	COMMUNAY	1					
	SAINT-BONNET-DE-MURE	0	0	0	0	1	1
Ain	VALSERHÔNE			2			
	BIRIEUX	0	1	3	0	4	5
	BOURG-EN-BRESSE	0	0	0	0	0	0
	PÉROUGES (Maïs Pérouges)	0	0	1	0	2	
	SAINT-CYR-SUR-MENTHON	2	0	0	6	6	0
	SAINT-JEAN-SUR-VEYLE	0	0	0	0	0	8
	SAINT-JUST	0	0	0	1	0	0
Ardèche	SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS			33	70	137	42


Les captures restent importantes et en augmentation sur une grande partie du réseau.

Pour ce ravageur il est particulièrement délicat de relier les captures dans les pièges et les risques de dégâts. L'héliothis est bien présent dans la Drôme, une vigilance est nécessaire sur les parcelles à risque, particulièrement sur maïs semences.

La majorité des maïs semences sont au stade floraison, c'est le stade où la nuisibilité de l'héliothis est importante. Le risque est donc élevé pour les parcelles ayant atteint cette étape du cycle. Les attaques de ce ravageur peuvent entraîner une perte de rendement avéré en maïs semences.

Les maïs grain et fourrage sont en pleine floraison, depuis deux semaines déjà pour certaines parcelles. Cependant le risque est moins impactant sur la productivité qu'en maïs semences, mais les galeries présentes sur les épis peuvent favoriser l'apparition de mycotoxines.

Analyse de risque





Titre : Heliothis


Description : Conséquence d'une attaque d'héliothis sur épi : le développement de Fusarium de la section liseola.




Titre : Heliothis

Description : Symptômes du passage d'une larve d'héliothis au sommet de l'épi : trace large, en creux, les soies ont été mangées.


Evolution pluriannuelle des captures des Héliothis (phéromones) Limons, Gravieres et sables superficiels de la Drome



Evolution pluriannuelle des captures des Héliothis (phéromones) Graviers et sables du Rhône de l'Ain et de l'Isère



Evolution pluriannuelle des captures des Héliothis (phéromones) Limons de la Bresse, de la Dombes et du Forez, Combes de Savoie



Rédaction : MONDAN Amandine

Notes nationales biodiversité

<https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/notes-nationales-biodiversite>



[LIEN NOTE NATIONALE AMBROISIE](#)

[LIEN NOTE DATURA](#)

[LIEN FICHE POPILLIA JAPONICA](#)

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée :

<http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/grandes-cultures>

Publication hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine VAURE (CRA AURA perrine.vaure@aura.chambagri.fr, 06 76 24 46 48)

À partir d'observations réalisées par : des coopératives et négoces agricoles, des instituts techniques, des Chambres d'Agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des lycées agricoles et avec la participation des agriculteurs.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ