

N°28

Date de publication
14/10/2026

Date d'observation
13/10/2026

Grandes cultures

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

 **GOUVERNEMENT**
Liberté
Égalité
Fraternité

À retenir cette semaine



Colza :

A retenir cette semaine :

- **Stades** : poursuite du développement des colzas, avec 95 % des parcelles ayant atteint ou dépassé le stade 4 feuilles. Les situations restent toutefois hétérogènes, avec quelques parcelles encore peu développées.
- **Grosses altises adultes** : captures toujours importantes dans le réseau. Des parcelles à 4 feuilles présentent des dégâts importants de morsures. La vigilance est à maintenir dans les rares parcelles < 4 feuilles.
- **Petites altises** : captures faibles et présence limitée dans le réseau.
- **Charançon du bourgeon terminal** : quelques captures isolées, principalement dans l'Ain, sans signe de démarrage généralisé du vol. Surveillance à maintenir.
- **Larves de grosses altises** : début de la surveillance, vérifier leur présence dans les parcelles dès à présent.
- **Limaces et tenthrède de la rave** : risque faible dans le réseau, avec une vigilance à maintenir sur les parcelles encore au stade sensible.




**CHAMBRE
D'AGRICULTURE**
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ


ARVALIS


**Terres
Inovia**

MÉTÉO

MERCREDI 14



13° / 20°

▼ 10 km/h

JEUDI 15



12° / 22°

↻ 5 km/h

VENDREDI 16



12° / 21°

▼ 10 km/h

SAMEDI 17



12° / 16°

▼ 20 km/h
40 km/h

DIMANCHE 18



9° / 14°

▼ 15 km/h

LUNDI 19



9° / 16°

▼ 10 km/h

MARDI 20



9° / 16°


▼ 10 km/h

Prévisions météo à 7 jours (Météo France, Pusignan, 13/10/2026 à 14h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

RÉSEAU 2026-2027

Cette semaine, **41 parcelles** du réseau ont été observées.

Parcelles BSV observées du 2026-10-06 au 2026-10-13



Parcelles du réseau BSV Rhône-Alpes observées le 12/10/2026 et le 13/10/2026

STADE DES COLZAS


Cette semaine :

Cette semaine :

- Les observations portent sur des parcelles allant du stade **3 feuilles (B3)** au stade **> 10 feuilles**, avec respectivement 2 et 4 parcelles à ces stades.
- Le **stade 8 feuilles** est le plus représenté (20 % des parcelles), suivi du stade **6 feuilles** (17 %).
- **95 %** des parcelles ont atteint ou dépassé le stade 4 feuilles.
- **5 %** des parcelles sont aux stades **1 à 3 feuilles**.

Les colzas poursuivent leur développement, avec une progression nette des stades depuis la semaine dernière. **La majorité des parcelles se situe désormais à plus de 6 feuilles (60 %)**. Les situations restent néanmoins très hétérogènes selon les parcelles. Sur certaines parcelles des colzas sont encore au stade cotylédons ou en cours de levée.

Les pluies de la semaine dernière ont favorisé le développement des colzas, notamment dans les parcelles les plus avancées, qui présentent désormais une bonne biomasse.



Répartition des parcelles observées selon le stade de développement du colza

RAVAGEURS

Ravageur	Risque
Grosses altises (altises d'hiver)	● Faible à ● Elevé
Petites altises (altises des crucifères)	● Faible
Charançon du bourgeon terminal	● Faible
Limaces	● Faible
Tenthrède de la rave	● Faible
Larves de grosses altises	● Début des observations

À noter également : la présence de puceron cendré sur une parcelle, ainsi que la présence d'une noctuelle sur une parcelle également.

Reconnaissance :

	Reconnaissance	Période et seuil de risque
Altises d'hiver ou grosses altises ADULTES	Gros coléoptère de 3 à 5 mm de long au corps noir et brillant avec des reflets bleus métalliques sur le dos. Les extrémités des pattes, des antennes et de la tête sont roux dorés. Elle est reconnaissable aussi par des « grosses cuisses » qui lui permettent de sauter pour se déplacer dans la parcelle.  <i>Grosse altise adulte (Crédit : L. Jung, Terres Inovia)</i>	De la levée au stade 3 feuilles 80 % de plantes touchées ET 25 % de la surface foliaire détruite En cas de levée tardive (après le 1^{er} octobre) et/ou de faible vitesse de développement des colzas, le seuil de nuisibilité est abaissé à 3 plantes sur 10 avec morsures.
Altises des crucifères ou petites altises	Petit coléoptère noir ou bicolore (noir, avec 1 ou 2 bandes longitudinales jaunes sur chaque élytre). Il mesure 2 à 2,5 mm.  <i>Petites altises (Crédit : L. Jung, Terres Inovia)</i>	De la levée au stade 3 feuilles 80 % de plantes touchées ET 25 % de la surface foliaire détruite En cas de levée tardive (après le 1^{er} octobre) et/ou de faible vitesse de développement des colzas, le seuil de nuisibilité est abaissé à 3 plantes sur 10 avec morsures.


Observations :

- Piégeage :

Grosses altises adultes ou altises d'hiver	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	40	42
Parcelles avec des captures	39	40
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	15 (entre 1 et 110)	17,8 (entre 1 et 72)

Altises des crucifères ou petites altises	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	15	24
Parcelles avec des captures	4	10
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	4,5 (entre 2 et 6)	2,6 (entre 1 et 5)

Les captures de **grosses altises** sont **stables et importantes cette semaine**, avec 39 parcelles sur 40 qui ont des captures. Le nombre moyen d'individus capturés par cuvette a légèrement diminué.



Evolution des captures de grosses altises dans le réseau BSV Rhône-Alpes sur les trois dernières années (moyenne des captures hors valeurs nulles)

- Dégâts sur plante :

Plantes avec morsures d'altises	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	9	19
Parcelles avec morsures en cœur de parcelle	6	4
% moyen de plantes touchées	46,5 % (10 à 100 %)	33,3 % (2 à 100 %)

Surfaces foliaires	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	8	13
Parcelles avec des surfaces foliaires détruites	5	9
% moyen de surface foliaire détruite	8,6 % (3 à 25 %)	6,1 % (1 à 30 %)

Les dégâts restent globalement limités, avec une surface foliaire détruite de 8,6 % en moyenne. Une parcelle au stade 3 feuilles se distingue avec 100 % de plantes touchées et 25 % de surface foliaire détruite, atteignant les seuils de risque.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Analyse du risque :

La majorité des colzas ayant dépassé le stade 4 feuilles, ils sont désormais sortis de la période de sensibilité aux dégâts d'altises. Seules 5 % des parcelles du réseau sont encore à un stade inférieur au stade 4 feuilles. La vigilance doit donc principalement se concentrer sur ces parcelles encore sensibles, en particulier lorsque les dégâts sont importants.

Pour rappel, le risque vis-à-vis des altises est à considérer lorsque plus de 80 % des plantes présentent des morsures et que plus de 25 % de la surface foliaire est détruite.

- **Pour les colzas n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles et présentant des dégâts, le risque est élevé.** Une surveillance régulière de l'évolution des morsures est recommandée.
- **Pour les parcelles ayant atteint le stade 4 feuilles et/ou ne présentant pas de dégâts, le risque est faible.** Une vigilance reste toutefois recommandée sur les bordures et les parcelles à proximité d'anciens colzas.

Pour les parcelles du réseau, **le risque est faible à élevé, vigilance particulière sur les rares parcelles encore au**



avec une stade sensible.



Le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyréthriinoïdes » présente un risque de résistance. [Pour plus d'informations, consulter le site R4P.](#)

Levier agronomique :

Dans les zones où des repousses de colza sont présentes, la destruction de celles-ci entraîne un déplacement des populations de petites altises vers les parcelles nouvellement semées. Il est donc recommandé de maintenir les repousses sur les parcelles à proximité des parcelles de colza.

Afin de ne pas déplacer les populations de petites altises, il est préférable d'attendre que les nouveaux colzas aient dépassé la période de risque (4-5 feuilles) avant de détruire les repousses.

Charançon du bourgeon terminal (CBT)

Reconnaissance :

Le CBT adulte mesure de 2,5 à 3,7 mm. Corps brillant et noir avec une pilosité courte clairsemée. Taches latérales blanches entre le thorax et l'abdomen. Extrémités des pattes rousses.



Charançon du bourgeon terminal (Terres Inovia)



Baris (Terres Inovia)

Attention à ne pas confondre le CBT avec le baris des crucifères. Le baris présente un rostre beaucoup plus recourbé et sa nuisibilité pour la culture n'est pas avérée.

Les adultes ne sont pas nuisibles, mais ils pondent dans les pétioles à l'automne. La nuisibilité est due aux larves qui détruisent le bourgeon terminal lorsqu'elles passent dans le cœur des plantes au stade rosette. Au printemps, les plantes ont alors un aspect buissonnant. La lutte contre les larves n'est pas possible avec les insecticides disponibles. La lutte vise donc les adultes avant qu'ils ne pondent.

Période de risque :

La période de risque débute avec l'arrivée des adultes dans les parcelles et se poursuit jusqu'au décollement du bourgeon terminal. **La cuvette jaune positionnée sur la végétation est indispensable pour suivre les vols.** Les vols peuvent s'étaler de fin septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Seuil indicatif de risque :


Il n'existe pas de seuil de risque pour ce ravageur. La détection des premiers adultes dans les cuvettes constitue un signal de vigilance, **mais ne signifie pas nécessairement qu'une intervention est immédiatement nécessaire.** Les femelles deviennent généralement aptes à pondre 10 à 15 jours après les premières captures, avec une durée pouvant être plus longue pour les individus arrivants précocement. Les larves migrent ensuite des pétioles vers le cœur de la plante, où elles peuvent provoquer des dégâts importants, notamment par destruction du bourgeon terminal.

Observations :

- Piégeage

Charançon du bourgeon terminal	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	37	38
Parcelles avec des captures	5	3
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	1,4 (1 à 2)	1,3 (1 à 2)


Quelques captures isolées de CBT sont toujours enregistrées, sans signe de démarrage généralisé du vol. Aucun dégât n'est observé à ce stade. Quatre des cinq parcelles avec captures sont situées dans le centre de l'Ain ; la cinquième se situe dans le nord de la Drôme.



Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage de CBT dans le réseau BSV Rhône-Alpes

Un outil de prédiction des vols

L'outil de prédiction des vols de CBT permet de suivre les probabilités de capture à l'échelle de chaque commune. **Probabilité de capture au 13 octobre à Pusignan : 31,5 %**



Prédiction des vols de charançon du bourgeon terminal à Pusignan (69) le 13/10/2026.

<https://www.terresinovia.fr/fr/oad/prediction-des-vols-de-ravageurs>

Analyse du risque :

Les captures restent faibles et dispersées, sans signe de démarrage généralisé du vol.

À ce stade, **le risque est faible à l'échelle du réseau**, mais la surveillance des cuvettes doit être maintenue et le risque réévalué en fonction de l'évolution du vol et de la croissance des colzas. Une éventuelle intervention doit être positionnée avant le début des pontes, et non à partir d'une capture isolée.



Le niveau de risque doit tenir compte de 3 paramètres :

- la date des premières captures significatives,
- la pression historique du ravageur sur le territoire,
- l'état du colza, notamment son développement, sa biomasse et sa capacité à poursuivre sa croissance à l'automne. La nuisibilité est plus importante lorsque le développement automnal du colza est faible.



Le couple « charançon du bourgeon terminal / pyrèthrinoïdes » présente un risque de résistance. [Pour plus d'informations, consulter le site R4P.](#)

Les cuvettes jaunes doivent être « posées » sur la végétation et il faut les relever souvent. Une cuvette enterrée ne convient pas pour suivre ce ravageur.

Risque historique	Risque agronomique	Indication de risque
Fort (attaques nuisibles fréquentes)	Biomasse < 25g/pied (800 g/m ² *) OU Croissance limitée (rougissement, faible disponibilité en azote, mauvais enracinement) OU Reprise intermédiaire à tardive	Risque fort
	Biomasse > 25 g/pied (800 g/m ² *) ET Croissance continue sans faim d'azote (pas de rougissement, disponibilité en azote, bon enracinement) ET Reprise précoce	Risque moyen
Faible (pas d'historique d'attaque ou attaque nuisible très rare)	Biomasse <20-25 g/pied (600 - 800 g/m ² *) OU Croissance limitée (rougissement, faible disponibilité en azote, mauvais enracinement)	Risque moyen
	Biomasse > 25 g/pied (800 g/m ² *) ET Croissance continue sans faim d'azote (pas de rougissement, disponibilité en azote, bon enracinement)	Risque faible

Limaces

Le colza est particulièrement appétant pour les limaces. Le risque est accru sur sol motteux, avec résidus pailleux. Un suivi régulier (observations, pièges) est indispensable.

Observations :

Plantes avec dégâts de limace	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	7	11
Parcelles avec dégâts de limace	3	3
% de la surface foliaire détruite	6,7 % (5 à 10 %)	4,7 % (2 à 10 %)

Les dégâts de limaces sont observés dans 3 parcelles sur 7, contre 3 sur 11 la semaine dernière, mais la surface foliaire détruite reste limitée.

Période de risque :

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Les limaces peuvent s'attaquer aussi bien aux graines en germination dans le sol, aux hypocotyles ou aux cotylédons qu'aux jeunes feuilles.

Il n'y a pas de seuil de risque pour les limaces. Le niveau d'attaque est très variable pour un même nombre de limaces piégées, même lorsque ce nombre est faible.

Analyse du risque :


Les dégâts restent globalement limités dans le réseau. Seules 5 % des parcelles sont encore au stade sensible (< 4 feuilles), même si l'hétérogénéité du développement peut maintenir localement des zones à risque au sein de certaines parcelles. Le risque est actuellement **faible**. La surveillance doit donc être maintenue sur les colzas encore peu développés.



Des solutions de biocontrôle à base de phosphate ferrique existent.

Tenthrede de la rave

Reconnaissance :



Tenthrede à l'état adulte (gauche) et larvaire (droite) (crédit : Terres Inovia)

La tenthrede est un hyménoptère qui à l'état adulte mesure 7 à 8 mm, présente un corps jaune orangé, à tête noire et aux ailes membraneuses. La larve mesure 20 à 50 mm. Elle est translucide, grisâtre voire verdâtre. Elle prend un aspect noirâtre en fin de développement et devient nuisible pour la culture en dévorant les feuilles.

Période et seuil de risque :

- **Période de risque** : de la levée jusqu'à 6 feuilles.
- **Seuil indicatif de risque** : $\frac{1}{4}$ de la surface foliaire détruite.

Observations :

- Piégeage

Tenthrede de la rave	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	12	15
Parcelles avec des captures	4	5
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	2,3 (1 à 4)	2,4 (1 à 4)

- Dégâts sur plante

Présence de larves	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	11	17
Parcelles avec présence de larves	3	4
% de plantes avec présence de larves	50 % (30 à 70 %)	55 % (30 à 80 %)

Surfaces foliaires	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	5	7
Parcelles avec des surfaces foliaires détruites	2	0
% moyen de surface foliaire détruite	5 %	0

Les captures restent faibles et les larves sont observées dans seulement 3 parcelles. Les dégâts restent limités.

Analyse du risque :

Le risque reste actuellement **faible** à l'échelle du réseau. Une surveillance reste recommandée dans les parcelles encore au stade sensible (< 6 feuilles).



Larves de grosses altises


Début de la surveillance

Reconnaissance :

Les larves de grosses altises mesurent 1,5 à 8 mm selon leur stade. Elles sont blanches, allongées et portent trois paires de pattes thoraciques. La tête est brun foncé et une plaque pigmentée est visible à l'extrémité postérieure, particulièrement marquée en fin de développement larvaire.

Attention aux confusions possibles avec les larves de charançons du bourgeon terminal et de mouches mineuses.

À l'automne et durant l'hiver, les larves minent principalement les pétioles des feuilles. En cas de forte infestation, de colzas chétifs ou d'une reprise de végétation tardive, elles peuvent atteindre le cœur de la plante et détruire le bourgeon terminal. Les plantes atteintes peuvent présenter un retard de végétation et/ou un port buissonnant.



Période de risque : de 5 feuilles jusqu'à la reprise de la végétation.

Seuil indicatif de risque :

Le seuil dépend du niveau de risque agronomique de la parcelle :

- **5 larves par plante en l'absence de risque agronomique**, notamment pour les colzas présentant une biomasse > 45 g/plante à l'entrée de l'hiver et une croissance continue
- **2 à 3 larves par plante en cas de risque agronomique** identifié.

Une autre méthode d'évaluation consiste à rechercher des larves dans les pétioles : le seuil est atteint lorsque **7 plantes sur 10 présentent au moins une larve (méthode Berlèse)** ou lorsque l'on trouve **2-3 larves par plante (méthode comptage dans les pétioles)**.

La nuisibilité est généralement limitée lorsque les colzas ont une croissance continue à l'automne et une reprise précoce au printemps.

Observations : Début de la surveillance

Analyse du risque : **Faible**

Pas de signalement dans le réseau à ce jour.

Il est fortement recommandé de vérifier la présence de larves sur l'ensemble des parcelles par la méthode Berlèse : [description de la méthode Berlèse](#)
Les premiers Berlèse seront à faire d'ici 10 jours environ.



Résultats des simulations :

La date du 20/09 (généralisation de la présence des grosses altises) peut être retenue comme date pivot pour le début des simulations d'apparition potentielle de larves.

Une simulation avec la date du 15/09 est cependant réalisée pour prendre en compte quelques arrivées plus précoces.

*En vert, calculs réalisés avec les données réelles sinon valeurs Normales 2002-2021

Stations Météo-France	Hypothèse Date accouplement altise adulte	Simulations des dates d'apparition des larves			Code station
		Eclosion Larves L1	Mue Larves L2	Mue Larves L3	
Ambérieu- Château- Gaillard (01)	15-sept	30/9	4/10	10/10	101
	20-sept	5/10	11/10	20/10	
	25-sept	12/10	20/10	31/10	
	01-oct	26/10	10/11	27/12	
Lyon-St Exupéry (69)	15-sept	29/9	3/10	7/10	6903
	20-sept	4/10	9/10	16/10	
	25-sept	11/10	17/10	26/10	
	01-oct	23/10	3/11	21/11	
Saint-Etienne de Saint-Geoirs (38)	15-sept	2/10	6/10	15/10	3801
	20-sept	7/10	15/10	24/10	
	25-sept	15/10	24/10	9/11	
	01-oct	1/11	5/12	18/3	
Etoile sur Rhône (26)	15-sept	28/9	2/10	5/10	2699
	20-sept	3/10	7/10	14/10	
	25-sept	9/10	15/10	22/10	
	01-oct	21/10	30/10	9/11	

MALADIES

Phoma

2 parcelles sur 21 ayant observé ce critère signalent la présence de macules de phoma.

Rappelons que la présence de macules sur feuilles à l'automne n'est pas corrélée aux attaques nuisibles sur pieds au printemps.

L'élongation, en revanche, peut constituer un facteur aggravant à ces attaques sur pied, qui sont les seules à être nuisibles.

➤ **Protection des pollinisateurs : REGLEMENTATION**

Plus d'informations [ICI](#)



[LIEN NOTE NATIONALE AMBROISIE](#)

[LIEN NOTE DATURA](#)

[LIEN FICHE POPILLIA JAPONICA](#)

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée :

<http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/grandes-cultures>

Publication hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine VAURE (CRA AURA perrine.vaure@aura.chambagri.fr, 06 76 24 46 48)

À partir d'observations réalisées par : des coopératives et négoce agricoles, des instituts techniques, des Chambres d'Agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des lycées agricoles et avec la participation des agriculteurs.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*