

BSV n°1

31 mars 2026

Viticulture

À retenir cette semaine

Les **stades phénologiques** observés vont du **gonflement du bourgeon** (BBCH01) à **2 feuilles étalées** (BBCH12) dans les secteurs les plus avancés.

Mange-bourgeons : Ces ravageurs sont observés sur la majorité des vignobles. Les dégâts sont très variables d'un vignoble à l'autre et d'une parcelle à l'autre. Localement, la fréquence de ceps touchés dépasse le seuil de nuisibilité (15 % de ceps avec au moins un bourgeon mangé) ce qui peut être très impactant pour la suite de la saison.

Excoriose : Sur les bois d'un an, la fréquence des symptômes est assez hétérogène d'un vignoble à l'autre. Sauf en Diois, tous les vignobles, dépassent le seuil de nuisibilité de 10 % de ceps symptomatiques. Localement certaines parcelles sont fortement touchées.

Les contaminations se font lors de longues périodes d'humectation (12 heures à 10°C ou 9 heures à 15°C). La dissémination des spores se fait sur de courtes distances, la maladie reste donc très localisée sur les ceps infectés des années précédentes.

En mesure préventive, il est conseillé de tailler les sarments contaminés et de les évacuer de la parcelle.

Mildiou : Le suivi biologique montre que les œufs de mildiou ne sont pas encore mûrs sauf en Ardèche sud. On estime qu'ils sont mûrs quand ils germent en moins de 24 heures à 20°C avec une humidité saturante. La situation devrait évoluer avec l'augmentation des températures en fin de semaine.

Gel : Localement, quelques bourgeons ou jeunes feuilles ont été touchés par le gel, mais sans gravité.

Tordeuses de la grappe : Les mâles émergent à partir de 550°C jours en base 0°C. Certains secteurs dépassent ou vont dépasser ce seuil dans les prochains jours. Pensez donc à installer vos pièges équipés de capsules à phéromones afin de suivre les vols d'Eudémis et autres tordeuses.

Météo (source : météo France) :

Jours précédents : temps frais, très nuageux et souvent venteux, avec quelques passages pluvieux


Prochains jours : temps ensoleillé et remontée des températures (autour de 20°C)

Le BSV est réalisé à partir des observations de la situation sanitaire dans le réseau de parcelles en Rhône-Alpes. Les observations sont effectuées par les membres du réseau BSV en application du protocole harmonisé national d'observations et sont saisies dans la base Vigicultures 2.0.

L'analyse de risque s'appuie localement sur l'utilisation de modèles de simulation.

Cette année, le réseau est constitué de 165 parcelles observées par 42 observateurs sur 20 cépages différents.

132 parcelles ont été observées cette semaine.



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



Prophylaxie et méthodes alternatives

Dans le cadre du plan Ecophyto 2030 et d'une lutte phytosanitaire la moins impactante possible, il faut privilégier avant tout **les mesures prophylactiques et le recours aux méthodes alternatives**.

Se référer au site EcophytoPic : <https://ecophytopic.fr/>



Note de service DGAL/SDQSPV pour la liste actualisée des produits de biocontrôle
<https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>



Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière.

De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'actions différents, alternance des modes d'action au sein d'un programme et/ou au fil des saisons, mosaïque spatiale.

Lien vers la note mise à jour en janvier 2026 : <https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2026-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne>

Lien vers le site R4P (état des lieux des résistances) : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

Note nationale biodiversité « Vers de terre » :

Si le rôle des vers de terre dans la fertilité des sols est admis depuis longtemps, leur implication dans la vitalité des cultures peut l'être aussi. Ils contribuent à l'enracinement, la nutrition et l'hydratation des végétaux, et ainsi à leur bon développement et à une meilleure résistance aux stress, aux phytophages et/ou aux maladies.



Vu dans les vignes



Stade BBCH09 (pointe verte) observé dans les Côtes du Rhône Nord (Crédit photo : CA42)



Stade BBCH10 (sortie des feuilles) observé dans le Beaujolais (Crédit photo : Agribio)



Stade BBCH14 (4 feuilles étalées) observé dans les Côtes du Rhône Nord d'une Syrah (Crédit photo : CA69)



Bourgeon gelé en Savoie (Crédit photo : Oxyane)



Symptôme d'excoriose sur un bois d'un an, en Côte du Rhône Nord (Crédit photo : Experenn)



Symptômes d'excoriose sur un bois d'un an, en Beaujolais (Crédit photo : CA69)



Bourgeon évidé et sa responsable : une boarmie (Crédit photo : CA69)



Bourgeon attaqué par un mange-bourgeons en Savoie (Crédit photo : Oxyane)



Cochenille lécanine (*Parthenolecanium corni*) (Crédit photo : CA69)

Vignoble Beaujolais – Côteaux du Lyonnais

Données du réseau : parcelles renseignées 27 sur 34

Stades phénologiques :

Cépage	Nombre d'observations	Stade le plus précoce	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
CHARDONNAY	6	Bourgeon dans le coton	Débourrement	Première feuille étalée
GAMAY	21	Gonflement du bourgeon	Pointe verte	Première feuille étalée

Sur le réseau de parcelles Beaujolais – Côteaux du Lyonnais, les stades observés en Chardonnay, vont de bourgeon dans le coton (BBCH05) à 1 feuille étalée (BBCH11).

Pour le Gamay, les stades observés vont de gonflement du bourgeon (BBCH03) à 1 feuille étalée (BBCH11) avec une majorité de parcelles au stade pointe verte (BBCH09).

Ce sont des données moyennes car il est possible d'observer localement et notamment en bout de baguette des stades plus avancés (par exemple 2-3 feuilles étalées).

Mange-bourgeons :

Pour rappel, les mange-bourgeons sont des chenilles (noctuelles, boarmies, chenilles bourruées...) qui s'attaquent aux bourgeons et jeunes feuilles de la vigne. Les dégâts apparaissent donc à partir du gonflement des bourgeons et jusqu'à l'écatement (sorte des feuilles). Ils sont **plus importants lorsque le débourrement est lent**, ce qui est actuellement le cas avec la diminution des températures des derniers jours.

Les dégâts observés sont assez minimes car en moyenne seulement 1,6 % des ceps ont au moins un bourgeon mangé. La parcelle la plus touchée a environ 12 % de ses ceps avec au moins un bourgeon mangé, ce qui est inférieur au seuil indicatif de nuisibilité de 15 %. **Le risque est donc faible.**




Excoriose :

Les symptômes caractéristiques sont des taches noires ponctiformes ou allongées sur le sarment qui nécrosent par la suite. Les sarments fortement atteints sont fragilisés et peuvent facilement se briser sous l'effet du vent ou du passage des matériels viticoles dans la parcelle.

Sur les bois d'un an (baguette ou courson), nous avons observé peu de parcelles avec des symptômes, avec en moyenne 5,9 % des ceps présentant au moins un symptôme. Cependant, lorsque ces parcelles sont touchées elles dépassent le seuil de nuisibilité de 10 %, avec des fréquences allant jusqu'à 50 %.

Le risque est donc faible à modéré selon les cas.



Mildiou :

La maturité des œufs de mildiou n'est pas encore acquise. Avec l'augmentation des températures prévue en fin de semaine, la situation devrait évoluer. Donc, **pour l'instant, le risque est nul.**

Gel :

Localement, **quelques bourgeons ou jeunes feuilles ont été touchés par le gel**, mais sans gravité.

Vignoble Forez - Roannais

Données du réseau : parcelles renseignées 6 sur 6

Stades phénologiques :

Cépage	Nombre d'observations	Stade le plus précoce	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
CHARDONNAY	2	Pointe verte	Pointe verte	Pointe verte
GAMAY	4	Bourgeon dans le coton	Pointe verte	Sortie des feuilles

Sur le réseau Forez - Roannais, toutes les parcelles de Chardonnay sont au stade pointe verte. Pour le Gamay, les stades observés vont de bourgeon dans le coton (BBCH03) à sortie des feuilles (BBCH10). Ce sont des données moyennes car il est possible d'observer localement et notamment en bout de baguette des stades plus avancés (par exemple premières feuilles étalées).

Mange-bourgeons :

Pour rappel, les mange-bourgeons sont des chenilles (noctuelles, boarmies, chenilles bourrues...) qui s'attaquent aux bourgeons et jeunes feuilles de la vigne. Les dégâts apparaissent donc à partir du gonflement des bourgeons et jusqu'à l'écatement (sorte des feuilles). Ils sont **plus importants lorsque le débourrement est lent**, ce qui est actuellement le cas avec la diminution des températures des derniers jours.


Quelques dégâts ont été observés dans le vignoble avec en moyenne 2,7 % des ceps ont au moins un bourgeon mangé. Le maximum est de 6 %, donc inférieur au seuil indicatif de nuisibilité de 15 %. **Le risque est donc faible.**



Excoriose :

Les symptômes caractéristiques sont des taches noires ponctiformes ou allongées sur le sarment qui nécrosent par la suite. Les sarments fortement atteints sont fragilisés et peuvent facilement se briser sous l'effet du vent ou du passage des matériels viticoles dans la parcelle.

Sur les bois d'un an (baguette ou courson), nous avons observé sur toutes les parcelles plus ou moins de symptômes d'excoriose. En moyenne, 12,3 % des ceps présentant au moins un symptôme. Un tiers des parcelles dépassent le seuil indicatif de nuisibilité fixé à 10%. **Le risque est donc faible à modéré selon les cas.**



Mildiou :

La maturité des œufs de mildiou n'est pas encore acquise. Avec l'augmentation des températures prévue en fin de semaine, la situation devrait évoluer. Donc, **pour l'instant, le risque est nul.**

Gel :

Aucun dégât de gel n'a été constaté sur les bourgeons ou jeunes feuilles. Le vent, présent au moment du refroidissement, a probablement limité les effets du gel.

Vignoble Côtes du Rhône nord

Données du réseau : parcelles renseignées 29 sur 32

Stades phénologiques :

Cépage	Nombre d'observations	Stade le plus précoce	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
MARSANNE	4	Débourrement	Débourrement	Sortie des feuilles
ROUSSANNE	2	Bourgeon dans le coton	Bourgeon dans le coton	Débourrement
SYRAH	19	Débourrement	Pointe verte	Première feuille étalée
VIOGNIER	4	Pointe verte	Sortie des feuilles	Sortie des feuilles

Sur le réseau de parcelles Côtes du Rhône Nord, les stades observés vont de bourgeon dans le coton (BBCH05) à 1 feuille étalée (BBCH11). Hormis les Roussanne, toutes les parcelles ont débourré et les premières feuilles sont déjà sorties.

Ce sont des données moyennes car il est possible d'observer localement et notamment en bout de baguette des stades plus avancés (par exemple 2-3 feuilles étalées).

Mange-bourgeons :

Pour rappel, les mange-bourgeons sont des chenilles (noctuelles, boarmies, chenilles bourrues...) qui s'attaquent aux bourgeons et jeunes feuilles de la vigne. Les dégâts apparaissent donc à partir du gonflement des bourgeons et jusqu'à l'éclatement (sorte des feuilles). Ils sont **plus importants lorsque le débourrement est lent**, ce qui est actuellement le cas avec la diminution des températures des derniers jours.

Les dégâts observés sont hétérogènes mais assez faibles car en moyenne 5,8 % des ceps ont au moins un bourgeon mangé. Quelques parcelles dépassent le seuil indicatif de nuisibilité de 15 %. **Le risque est donc faible à modéré selon les cas.**



Excoriose :

Les symptômes caractéristiques sont des taches noires ponctiformes ou allongées sur le sarment qui nécrosent par la suite. Les sarments fortement atteints sont fragilisés et peuvent facilement se briser sous l'effet du vent ou du passage des matériels viticoles dans la parcelle.

Sur les bois d'un an (baguette ou courson), quasiment toutes les parcelles sont touchées, avec une moyenne de 22,9 % (de ceps présentant au moins un symptôme). Beaucoup de parcelles dépassent le seuil de nuisibilité de 10 %, avec des fréquences allant jusqu'à 80 % (témoin non traité). **Le risque est donc faible à modéré selon les cas.**



Mildiou :

La maturité des œufs de mildiou n'est pas encore acquise. Avec l'augmentation des températures prévue en fin de semaine, la situation devrait évoluer. Donc, **pour l'instant, le risque est nul.**

Gel :

Aucun dégât de gel n'a été constaté sur les bourgeons ou jeunes feuilles. Le vent, présent au moment du refroidissement, a probablement limité les effets du gel.

Vignoble Ardèche sud

Données du réseau : parcelles renseignées 31 sur 41

Stades phénologiques :

Cépage	Nombre d'observations	Stade le plus précoce	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
CARIGNAN	2	Sortie des feuilles	Sortie des feuilles	Sortie des feuilles
CHARDONNAY	10	Bourgeon dans le coton	Sortie des feuilles	Première feuille étalée
CINSAULT	1	Pointe verte	Pointe verte	Pointe verte
GAMAY	1	Pointe verte	Pointe verte	Pointe verte
GRENACHE	5	Pointe verte	Pointe verte	2 feuilles étalées
MERLOT	5	Bourgeon dans le coton	Bourgeon dans le coton	Pointe verte
SAUVIGNON	1	Pointe verte	Pointe verte	Pointe verte
SYRAH	6	Bourgeon dans le coton	Pointe verte	Pointe verte

Pour le réseau de parcelles Ardèche sud, les stades observés sont plus avancés que dans les autres vignobles avec une majorité de parcelles au stade pointe verte (BBCH09). Plusieurs parcelles ont déjà les premières feuilles étalées.

Ce sont des données moyennes car il est possible d'observer localement et notamment en bout de baguette des stades plus avancés (par exemple 2-3 feuilles étalées).

Mange-bourgeons :

Pour rappel, les mange-bourgeons sont des chenilles (noctuelles, boarmies, chenilles bourruées...) qui s'attaquent aux bourgeons et jeunes feuilles de la vigne. Les dégâts apparaissent donc à partir du gonflement des bourgeons et jusqu'à l'écatement (sorte des feuilles). Ils sont **plus importants lorsque le débourrement est lent**, ce qui est actuellement le cas avec la diminution des températures des derniers jours.

Très peu de dégâts ont été observés (en moyenne 0,1 % des ceps ont au moins un bourgeon mangé). **Le risque est donc faible.**



Excoriose :

Les symptômes caractéristiques sont des taches noires ponctiformes ou allongées sur le sarment qui nécrosent par la suite. Les sarments fortement atteints sont fragilisés et peuvent facilement se briser sous l'effet du vent ou du passage des matériels viticoles dans la parcelle.

Sur les bois d'un an (baguette ou courson), beaucoup de parcelles sont touchées, avec une moyenne de 13,4 % (de ceps présentant au moins un symptôme). Beaucoup de parcelles dépassent le seuil de nuisibilité de 10 %, avec des fréquences allant jusqu'à 80 %. **Le risque est donc faible à modéré selon les cas.**



Mildiou :

Les premiers œufs de mildiou commencent à atteindre leur maturité. Mais, les conditions pour de potentielles contaminations primaires ne sont pas réunies (feuilles étalées, pluie significative, température moyenne supérieure à 10°C). Pour le moment donc, **le risque est faible**.



Gel :

Aucun dégât de gel n'a été constaté sur les bourgeons ou jeunes feuilles. Le vent, présent au moment du refroidissement, a probablement limité les effets du gel.

Vignoble Diois

Données du réseau : parcelles renseignées 21 sur 22

Stades phénologiques :

Cépage	Nombre d'observations	Stade le plus précoce	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
ALIGOTE	1	Pointe verte	Pointe verte	Pointe verte
CLAIRETTE	8	Dormance	NA	Début du gonflement du bourgeon
MUSCAT A PETITS GRAINS BLANCS	12	Début du gonflement du bourgeon	Bourgeon dans le coton	Débourrement

Sur le réseau de parcelles Diois, les Muscat commencent à débourrer (BBCH07) et les bourgeons des Clairette commencent à gonfler (BBCH03).

Ce sont des données moyennes car il est possible d'observer localement et notamment en bout de baguette des stades plus avancés.

Mange-bourgeons :

Pour rappel, les mange-bourgeons sont des chenilles (noctuelles, boarmies, chenilles bourruées...) qui s'attaquent aux bourgeons et jeunes feuilles de la vigne. Les dégâts apparaissent donc à partir du gonflement des bourgeons et jusqu'à l'écatement (sorte des feuilles). Ils sont **plus importants lorsque le débourrement est lent**.

Très peu de dégâts ont été observés (en moyenne seulement 0,3 % des ceps ont au moins un bourgeon mangé). Le maximum est de 4 %, donc inférieur au seuil indicatif de nuisibilité de 15 %. **Le risque est donc faible.**



Excoriose :

Les symptômes caractéristiques sont des taches noires ponctiformes ou allongées sur le sarment qui nécrosent par la suite. Les sarments fortement atteints sont fragilisés et peuvent facilement se briser sous l'effet du vent ou du passage des matériels viticoles dans la parcelle.

Sur les bois d'un an (baguette ou courson), peu de parcelles avec des symptômes ont été observées, avec en moyenne 1,5 % des ceps présentant au moins un symptôme. Aucune parcelle ne dépasse le seuil de nuisibilité fixé à 10%. **Le risque est donc faible.**



Mildiou :

La maturité des œufs de mildiou n'est pas encore acquise Avec l'augmentation des températures prévue en fin de semaine, la situation devrait évoluer. Donc, **pour l'instant, le risque est nul.**

Gel :

Aucun dégât de gel n'a été constaté sur les bourgeons ou jeunes feuilles. Le vent, présent au moment du refroidissement, a probablement limité les effets du gel.

Vignoble Savoie – Bugey – Balmes dauphinoises

Données du réseau : parcelles renseignées 18 sur 29

Stades phénologiques :

Cépage	Nombre d'observations	Stade le plus précoce	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
ALTESSE	1	Sortie des feuilles	Sortie des feuilles	Sortie des feuilles
CHARDONNAY	5	Bourgeon dans le coton	Pointe verte	Sortie des feuilles
CORBEAU	1	Bourgeon dans le coton	Bourgeon dans le coton	Bourgeon dans le coton
GAMAY	2	Débourrement	Débourrement	Débourrement
JACQUERE	2	Bourgeon dans le coton	Bourgeon dans le coton	Bourgeon dans le coton
MONDEUSE	5	Gonflement du bourgeon	Gonflement du bourgeon	Bourgeon dans le coton
PINOT NOIR	2	Gonflement du bourgeon	Gonflement du bourgeon	Pointe verte

Globalement, dans le réseau de parcelles Savoie – Bugey – Balmes dauphinoises, les parcelles sont au stade bourgeon dans le coton (BBCH05). Sauf les Chardonnay et Altesse plus précoces qui sont au stade sortie des feuilles (BBCH10).

Ce sont des données moyennes car il est possible d'observer localement et notamment en bout de baguette des stades plus avancés (par exemple premières feuilles étalées).

Mange-bourgeons :

Pour rappel, les mange-bourgeons sont des chenilles (noctuelles, boarmies, chenilles bourrues...) qui s'attaquent aux bourgeons et jeunes feuilles de la vigne. Les dégâts apparaissent donc à partir du gonflement des bourgeons et jusqu'à l'écatement (sorte des feuilles). Ils sont **plus importants lorsque le débourrement est lent**, ce qui est actuellement le cas avec la diminution des températures des derniers jours.

Les dégâts observés sont minimes car en moyenne seulement 3 % des ceps ont au moins un bourgeon mangé. Pour toutes les parcelles, les dégâts sont inférieurs au seuil indicatif de nuisibilité de 15 %. **Le risque est donc faible.**




Excoriose :

Les symptômes caractéristiques sont des taches noires ponctiformes ou allongées sur le sarment qui nécrosent par la suite. Les sarments fortement atteints sont fragilisés et peuvent facilement se briser sous l'effet du vent ou du passage des matériels viticoles dans la parcelle.

Sur les bois d'un an (baguette ou courson), plusieurs parcelles avec des symptômes ont été observées, avec en moyenne 14,4 % des ceps présentant au moins un symptôme. Les parcelles touchées dépassent le seuil de nuisibilité de 10 %, avec des fréquences allant jusqu'à 70 %.

Le risque est donc faible à modéré selon les cas.



Mildiou :

La maturité des œufs de mildiou n'est pas encore acquise. Avec l'augmentation des températures prévue en fin de semaine, la situation devrait évoluer. Donc, **pour l'instant, le risque est nul.**

Gel :

Localement, **quelques bourgeons ont été touchés par le gel**, mais sans gravité.

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les données compilées correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Prochain bulletin 08 avril 2026

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée : <https://ecophytopic.fr/>

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine VAURE (CRA AURA) perrine.vaure@aura.chambagri.fr

Animateur filière/Rédacteur : Ewen SOUBIGOU (CA 69) ewen.soubigou@rhone.chambagri.fr

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, FREDON-AURA, ADABIO, Agribio Rhône et Loire, Groupe Oxyane, C.A.M.B, GAIC CHOLAT, Soufflet Vigne, Ecovigne, Groupe Perret, Oedoria, Vignerons des Pierres Dorées, Vinescence, Vignerons Ardéchois, Cave de Die Jaillance, Cave de Saint-Désirat, Cooptain, Experenn, Groupe Bernard, Latour Ardèche, EPL Olivier de Serres / Ferme expérimentale Le Pradel, Fédération des caves coopératives en Beaujolais, Syndicat des Vins de Savoie.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**




GOUVERNEMENT
*Liberté
Égalité
Fraternité*