n° 9

Date de publication

03 juin 2025

# Viticulture

Crédit photo : Réseau des Chambres d'Agriculture

## À retenir cette semaine

Les floraisons se terminent (BBCH 68 – 71) sur les secteurs les plus précoces mais pour la majorité des parcelles la floraison bat son plein (BBCH 60 – 65). Quelques parcelles des secteurs plus tardifs sont encore au stade boutons floraux séparés (BBCH 57) mais la floraison ne devrait pas tarder.

**Mildiou** :
Le développement de la maladie s'est poursuivi cette semaine et les premiers symptômes sur inflorescences/grappes sont visibles (inflorescence en crosse ou/et présence de rot gris, aspect « grain de sel ») sur de nombreux secteurs.
Le risque est fort en cas de pluie ou d'humidité persistante (averses, rosées).

**Oïdium** : Quelques taches sur feuilles sont observables en coteaux du Lyonnais, dans le Forez-Roannais et en Côtes-du-rhône Nord. Rien à signaler sur les autres secteurs.

**Black rot :** La maladie est en progression. Des sorties plus conséquentes sur feuilles ont été observées sur l'ensemble des secteurs. Quelques symptômes sont aussi visibles sur grappes.

Pour prévenir ou réduire l'impact des maladies cryptogamiques il est important de maitriser la vigueur par diverses mesures (relevage, effeuillage, rognage, …). Il faut réduire le maintien d'humidité dans le feuillage.
Il est également possible d'éliminer les pampres et les feuilles contaminées (si faible présence de la maladie).

**Cicadelle de la flavescence dorée** : Des larves ont pu être observées dans tous les vignobles.

**Tordeuses de la grappe** : On observe à présent des œufs et glomérules dans l'ensemble des vignobles avec parfois des fréquences importantes.

**Prévision météo** (météo France tendances) :

**Cette semaine** : La semaine devrait être pluvieuse et les températures assez douces.

**La semaine prochaine** : La semaine devrait être chaude et sèche sur l'ensemble de la France, avec un caractère plus marqué au sud.

BSV réalisé en fonction des observations de la situation sanitaire des vignobles à partir des données de la base Vigicultures 2.0 pour les vignobles suivis dans le cadre du réseau de parcelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Observations effectuées par les membres du réseau BSV en application du protocole harmonisé national d'observations.
L'analyse de risque s'appuie localement, lorsque disponible, sur l'utilisation de modèles de simulation : Milstop, Decitrait, Rimpro…

Cette année, le réseau comprend 165 parcelles observées par 40 observateurs sur 29 cépages différents.
**143 parcelles observées** jusqu'au 03 juin 2025.

## Prophylaxie et méthodes alternatives

Dans le cadre du plan Ecophyto II+ et d'une lutte phytosanitaire la moins impactante possible, il faut privilégier avant toute chose **les mesures prophylactiques et le recours aux méthodes alternatives**.

**Se référer au site EcophytoPic : https://ecophytopic.fr/**

Note de service DGAL/SDQSPV pour la liste actualisée des produits de biocontrôle
https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière.

De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'actions différents, alternance des modes d'action au sein d'un programme et/ou au fil des saisons, mosaïque spatiale.

**Lien vers la note mise à jour février 2025** : https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2024-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne

Lien vers le Site R4P (état des lieux des résistances) : https://www.r4p-inra.fr/fr/notes-communes/

## Notes biodiversité et réglementaire

### Protection des pollinisateurs : REGLEMENTATION

Depuis le 1er janvier 2022, les **conditions d'autorisation et d'utilisation** des produits phytopharmaceutiques en période de floraison pour certaines cultures ainsi que l'étiquetage de ces produits sont encadrés par l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces conditions visent aussi bien les insecticides et acaricides que les fongicides et herbicides, ainsi que les adjuvants.

Plus d'informations ICI

LIEN NOTE NATIONALE AMBROISIE
LIEN NOTE DATURA

## Vu dans les vignes :

**Mildiou sur inflorescence : symptôme d'inflorescence en « crosse » et rot gris ; Crédit photo : CA 42**

**Micrommate Emeraude (*Micrommata virescens*) ; Crédit photo : Vinescence.**

**Chenille de cossus gâte-bois (*Cossus cossus*) ; Crédit photo : Vinescence.**

**Black-rot sur pétiole ; Crédit photo : CA 69**

# Vignoble Beaujolais – Coteaux du Lyonnais

## Données du réseau : parcelles renseignées 32 sur 34

## Stades phénologiques

| Cépages | Le plus tardif | Majoritaire | Le plus avancé |
|---|---|---|---|
| Chardonnay | Début floraison | Mi- à Fin floraison | Nouaison |
| Gamay | Début floraison | Début à mi-floraison | Nouaison |

## Résumé :

**Stades phénologiques :**

- **Pour le Gamay,** les stades observés vont de **Premières fleurs** à **Nouaison.**
- **Pour le Chardonnay,** les stades observés vont de **Début floraison à Nouaison.**

## Mildiou (*Plasmopara viticola*)

| MILDIOU SUR FEUILLES / 100 F | Nombre de parcelles notées **32** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 6 | 19 % |
| 0-1 | 3 | 9,5 % |
| 1-10 | 11 | 34 % |
| >10 | 12 | 37,5 % |

Les taches sur feuilles liées aux pluies du 19-20-22 mai sont toutes extériorisées depuis la fin de semaine dernière, dans les parcelles visitées, ces pluies n'ont pas entrainé une grosse évolution des symptômes sur feuilles. En revanche, sur grappes, hier, sur certains témoins non traités, on observait les premières conséquences de ces pluies sur grappes (grappes pas forcément en crosse, mais sporulations sur certaines fleurs/boutons floraux).

Concernant les pluies de samedi, dimanche et lundi, les symptômes sur feuilles devraient apparaitre dès demain (le 4 juin) pour les pluies de samedi. Le reste devrait apparaitre d'ici la fin de la semaine. Concernant les symptômes sur grappes liés à ces pluies, pour une même pluie, on peut encore compter une petite semaine de décalage entre les symptômes sur feuilles et ceux sur grappes.

## Oïdium (*Erysiphe necator*)

En Beaujolais, la situation n'a pas évolué pas depuis la semaine dernière.




En Coteaux du Lyonnais, les premiers symptômes sont observés dans la parcelle témoin de Chardonnay à Millery.

## Black rot (*Guignardia bidwellii*)

| NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F | Nombre de parcelles notées **32** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 12 | 37,5 % |
| 0-1 | 10 | 3 % |
| 1-5 | 4 | 12,5 % |
| >5 | 6 | 18,5 % |

En Beaujolais et en Coteaux du Lyonnais, la progression des symptômes sur feuilles reste très légère.

## Cicadelle de la flavescence dorée :

Selon les parcelles, on observe des populations plus ou moins importantes, les premières larves au stade L2 sont visibles.

# Vignoble Forez - Roannais

## Données du réseau : parcelles renseignées 6 sur 6

## Stades phénologiques

| Cépages | Le plus tardif | Majoritaire | Le plus avancé |
|---|---|---|---|
| Chardonnay (2 parcelles) | Premières fleurs | | Début floraison |
| Gamay | Boutons floraux séparés | Début floraison | Début floraison |

## Résumé :

**Stades phénologiques :**
Les parcelles observées vont de début floraison à mi floraison.

## Mildiou (*Plasmopara viticola*)

On observe des sorties de mildiou sur grappes dues aux pluies du 20 mai. D'autres incubations sont encore en cours et devraient s'extérioriser en milieu de semaine.

## Oïdium (*Erysiphe necator*)

Comme la semaine dernière, on observe des symptômes isolés sur deux-trois parcelles. Le risque augmente vis-à-vis du stade de développement de la vigne et le climat frais et couvert.

## Black rot (*Guignardia bidwellii*)

On rencontre plus fréquemment des symptômes sur feuilles cette semaine. Cette sortie est la conséquence des pluies du 19 mai.

## Cicadelle de la flavescence dorée :

Cette semaine, 8 cicadelles ont été observées sur une parcelle à historique.

# Vignoble Côtes du Rhône nord

## Données du réseau : parcelles renseignées 25 sur 34

## Stades phénologiques

| Cépages | Le plus tardif | Majoritaire | Le plus avancé |
|---|---|---|---|
| Marsanne | Premières fleurs | Mi-floraison | Fin floraison |
| Roussanne (1 parcelle) | | Fin floraison | |
| Syrah | Boutons floraux séparés | Fin floraison | Nouaison |
| Viognier (2 parcelles) | Fin floraison | | Grains de plomb (2 à 5 mm) |

## Résumé :

Cette semaine, les stades vont globalement de boutons floraux séparés à nouaison pour les secteurs les plus précoces.

## Mildiou (*Plasmopara viticola*)

| MILDIOU SUR FEUILLES / 100 F | Nombre de parcelles notées **25** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 18 | 72 % |
| 0-1 | 4 | 16 % |
| 1-10 | 3 | 12 % |
| >10 | 0 | 0 % |

Des symptômes sur feuilles sont visibles leurs fréquences demeurent cependant peu élevées. A ce jour, aucun symptôme sur grappe/inflorescence n'a été observé.




## Oïdium (*Erysiphe necator*)

La présence de tache sur feuille a augmenté depuis la semaine dernière (avec au maximum 3% de feuilles touchées sur les 3 parcelles présentant des symptômes). Comparée aux derniers millésimes, la pression semble dans la moyenne concernant cette maladie.




## Black rot (*Guignardia bidwellii*)

| NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F | Nombre de parcelles notées **25** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 10 | 40 % |
| 0-1 | 5 | 20 % |
| 1-5 | 4 | 16 % |
| >5 | 6 | 24 % |

Les symptômes continuent d'évoluer sur feuilles et on observe maintenant quelques symptômes sur grappe/inflorescence.

## Tordeuses de la grappe :

Dans le réseau, des glomérules sont observables mais à des fréquences ne dépassant pas les 10 % de grappes touchées. Cela peut cependant être le cas dans des parcelles hors réseau, ces zones sont limitées.

# Vignoble Diois

## Données du réseau : parcelles renseignées 20 sur 22

## Stades phénologiques

| Cépages | Le plus tardif | Majoritaire | Le plus avancé |
|---|---|---|---|
| Aligoté (1 parcelle) | | Pleine floraison | |
| Clairette | Boutons floraux séparés | Début floraison | Pleine floraison |
| Muscat | Boutons floraux séparés | Pleine floraison | Pleine floraison |

## Résumé :

**Stades phénologiques :**
La floraison se poursuit cette semaine.

- Dans les **secteurs les plus précoces**, les Muscats sont au stade « pleine floraison ». Les Clairettes sont au stade « début floraison ».
- Dans le **Bas Diois**, les Muscats sont au stade « pleine floraison ». Les Clairettes sont au stade « 1ères fleurs ».
- Dans le **Haut Diois**, les Muscats sont au stade « 1ères fleurs » et les Clairettes au stade « boutons floraux séparés ».

## Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Sur le réseau, 30% des parcelles ont des symptômes sur feuilles. La fréquence de contamination est de l'ordre de 1% des ceps atteints. Cependant, certaines parcelles hors réseau présentent des sorties plus importantes.
Sur grappes de rares symptômes ont été observés.
Le risque est fort en cas de pluie ou d'humidité persistante (averses, rosées).

## Oïdium (*Erysiphe necator*)

Aucun symptôme n'a été observé à ce jour.
Cependant le risque reste important vis-à-vis du stade de développement de la vigne.

## Black rot (*Guignardia bidwellii*)

| NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F | Nombre de parcelles notées **20** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 10 | 50 % |
| 0-1 | 7 | 35 % |
| 1-5 | 2 | 10 % |
| >5 | 1 | 5 % |

La maladie est en progression mais la fréquence reste faible.

## Cicadelle de la flavescence dorée : Observation de larves sur Saillans.

# Vignoble Savoie – Bugey – Balmes dauphinoises

## Données du réseau : parcelles renseignées 26 sur 30

## Stades phénologiques

| Cépages | Le plus tardif | Majoritaire | Le plus avancé |
|---|---|---|---|
| Altesse (3 parcelles) | Début floraison | Fin floraison | Fin floraison |
| Chardonnay | Début floraison | Mi- à Fin floraison | Nouaison |
| Gamay (2 parcelles) | Début floraison | | Nouaison |
| Jacquère (2 parcelles) | Boutons floraux séparés | | Mi-floraison |
| Mondeuse (2 parcelles) | Premières fleurs | | Début floraison |

## Résumé :

**Stades phénologiques :**
Malgré une belle semaine, chaude, plutôt sèche et venteuse, la floraison avance à pas dispersés avec des vignes tardives qui sont toujours au stade boutons floraux séparés (BBCH57) et des vignes ayant atteint la nouaison (BBCH71) pour les vignes les plus précoces. La majorité des vignes se situant au stade fin floraison (BBCH68).

## Mildiou (*Plasmopara viticola*)

La situation cryptogamique reste très bonne sur les parcelles du réseau, avec des fréquences d'attaque inférieures à 4% et des symptômes uniquement visibles sur feuilles.
Hors réseau, certaines parcelles peuvent être davantage touchées suite à des problèmes de traitement ou/et des phénomènes de résistance avec des symptômes d'inflorescences/grappes en crosse observés.

## Oïdium (*Erysiphe necator*)

Toujours rien concernant l'oïdium dans le réseau, en revanche, hors réseau une première présence fugace, a été observée, dans un secteur très sensible du Bugey.




## Black rot (*Guignardia bidwellii*)

| NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F | Nombre de parcelles notées **26** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 14 | 54 % |
| 0-1 | 6 | 23 % |
| 1-5 | 6 | 23 % |
| >5 | 0 | 0 % |

Pour ce qui est du black rot, de nouveaux symptômes sont apparus de façon plus régulière sur les parcelles sensibles, avec des symptômes sur feuilles oscillant entre 4 et 15% de fréquence et 1% d'intensité.
Avec l'instabilité météorologique de cette semaine, on pourrait observer une dégradation de l'état sanitaire ces prochains jours, si nous n'avons de fenêtre d'opportunité pour traiter.

## Ravageurs : La présence de cochenilles par endroit est à noter ainsi que quelques glomérules de Cochylis et Eudémis.

## Cicadelle de la flavescence dorée :

Quelques larves ont été observées sur les parcelles du réseau mais hors réseau, on en observe d'avantages.

# Vignoble Sud Ardèche

## Données du réseau : parcelles renseignées 34 sur 41

## Stades phénologiques

| Cépages | Le plus tardif | Majoritaire | Le plus avancé |
|---|---|---|---|
| Chardonnay | Fin floraison | Fin floraison | Nouaison |
| Grenache N (pas d'observation) | | | |
| Merlot (3 parcelles) | Mi-floraison | Mi-floraison | Fin floraison |
| Syrah | Début floraison | Début floraison | Nouaison |

## Résumé :

La semaine dernière, les conditions météo ont été très favorables au développement de la vigne ainsi qu'à l'assainissement de la végétation. Depuis ce week-end, des épisodes orageux sont tombés sur le sud du département avec des précipitations variables selon les communes. Demain s'annonce un fort épisode de pluie 20 à 30 mm suivi du retour du beau temps.

**Stades phénologiques :**
La floraison est en train de finir sur une grande majorité des parcelles du réseau (BBCH 69 – 71). Les secteurs et cépages plus tardifs débutent juste la floraison (BBCH 65).

## Mildiou (*Plasmopara viticola*)

| MILDIOU SUR FEUILLES / 100 F | Nombre de parcelles notées **34** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 26 | 76,5 % |
| 0-1 | 0 | 0 % |
| 1-10 | 6 | 17,5 % |
| >10 | 2 | 6 % |

**État sanitaire :** Apparition de nouveaux foyers sur les parcelles du réseau : Beaulieu, Bessas et Vallée du Rhône. Sur les secteurs touchés précédemment par la maladie, les symptômes continuent sur feuille avec de nouveaux repiquages sur grappe (Payzac, Mirabel).
**Risque :** Moyen sur les parcelles sans symptômes et fort sur les parcelles avec des repiquages sur feuille et/ou grappe.

## Oïdium (*Erysiphe necator*)

**État sanitaire** : Aucun nouveau symptôme observé sur l'ensemble des parcelles du réseau.
**Risque** : Malgré des contaminations faibles, le risque reste moyen (selon les OAD).




## Black rot (*Guignardia bidwellii*)

| NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F | Nombre de parcelles notées **34** | % parcelles (sur parcelles notées) |
|---|---|---|
| Absence | 25 | 73,5 % |
| 0-1 | 2 | 6 % |
| 1-5 | 2 | 6 % |
| >5 | 5 | 14,5 % |

**Pression sanitaire** : Les symptômes continuent leur évolution sur feuille et sur grappe sur l'ensemble du territoire.
**Risque** : Risque fort sur les parcelles déjà contaminées et moyen sur les parcelles indemnes.

## Tordeuses de la grappe :

➔ **Eudémis, Cochylis, Eulia :**

**Situation actuelle** : Apparition de glomérules sur la commune de Payzac. L'évolution des larves se poursuit à Rosières et Lablachère.

**Stratégie** : L'intervention sur la génération 2 (G2) dépendra de l'observation des glomérules présents et des dégâts constatés lors de la génération 1 (G1) et de l'année N-1.

➔ **Cryptoblabes :**

**Surveillance** : St-Marcel-d'Ardèche, St-Montant, Bourg-St-Andéol, St-Just-d'Ardèche, St-Martin-d'Ardèche, Orgnac, Beaulieu, Payzac, Lablachère.

**État actuel** : Premiers vols observés la semaine dernière. 4 papillons sur la commune de St-Marcel. Un nouveau relevé des pièges sera effectué cette semaine.

## Cicadelle de la flavescence dorée :

**Actions en cours** :

- Traitements en cours dans toutes les zones de lutte obligatoire (PLO).
- Respect strict des règles d'utilisation des insecticides.
- Déploiement imminent des pièges de suivi du vecteur sur l'ensemble du territoire.

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les données compilées correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

# Prochain bulletin 11 juin 2025

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.
*https://ecophytopic.fr/*

*Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation*

**Directeur de publication :** Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
**Coordonnées du référent :** Perrine VAURE (CRAAURA) perrine.vaure@aura.chambagri.fr
**Animateur filière/Rédacteur :** Juliette SARRAZIN – juliette.sarrazin@rhone.chambagri.fr / Marie-Marie CARCAILLET - marie-marie.carcaillet@rhone.chambagri.fr

**À partir d'observations réalisées par :** les Chambres d'Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, FREDON-AURA, ADABIO, Agribio Rhône et Loire, Groupe Oxyane, C.A.M.B, GAIC CHOLAT, Soufflet Vigne, Ecovigne, Groupe Perret, Oedoria, Vignerons des Pierres Dorées, Vinescence, Vignerons Ardéchois, Cellier des Gorges de l'Ardèche, Cave de Tain l'Hermitage, Cave de Die Jaillance, Cave de Saint-Désirat, Cooptain, Experenn, Groupe Bernard, Latour Ardèche, EPL Olivier de Serres / Ferme expérimentale Le Pradel, Fédération des caves coopératives en Beaujolais, Syndicat des Vins de Savoie.

*Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.*

*Action du plan Écophyto II +, piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la Biodiversité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ