n° 10
Date de publication
11 juin 2025

Viticulture

Crédit photo : Réseau des Chambres d'Agriculture

À retenir cette semaine

Les stades phénologiques observés vont de boutons floraux séparés (BBCH57) à baies taille grains de pois (BBCH75) dans les secteurs plus avancés. Les températures ont été favorables au développement de la vigne, le stade majoritaire observé est la nouaison (BBCH71).

Mildiou : Les symptômes continuent d'évoluer sur l'ensemble des secteurs. Le risque est présent.

Oïdium : La maladie est peu présente selon les secteurs. Il faut rester vigilant surtout sur les parcelles avec un historique sur cette maladie.

Black rot : Présent sur feuille dans l'ensemble des vignobles. Quelques rares attaques sur grappes ont été observées.

Cicadelle de la flavescence dorée :
Les larves sont présentes sur tous les vignobles.
Retrouvez les dates de **traitements obligatoire** par département sur les communiqués d'informations réglementaires et techniques 2025 : Zone délimitée - traitements insecticides | DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
Carte interactive du nombre de traitements obligatoires : https://carto.open-datara.fr/1/carte_flavescence_doree_2025.map

Tordeuses de la grappe : Présence de glomérules. Le risque est faible.

Prévision météo (météo France tendances) :
Cette semaine : La météo devrait être ensoleillée et chaude, jusqu'à samedi où des orages sont attendus sur l'ensemble de la région, avec des pluies se poursuivant dimanche.
Semaine prochaine : Les conditions devraient être majoritairement sèches et anticycloniques avec des températures supérieures aux normales de saison.

BSV réalisé en fonction des observations de la situation sanitaire des vignobles à partir des données de la base Vigicultures 2.0 pour les vignobles suivis dans le cadre du réseau de parcelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Observations effectuées par les membres du réseau BSV en application du protocole harmonisé national d'observations.
L'analyse de risque s'appuie localement, lorsque disponible, sur l'utilisation de modèles de simulation : Milstop, Decitrait, Rimpro…

Cette année, le réseau comprend 165 parcelles observées par 40 observateurs sur 29 cépages différents.
149 parcelles observées jusqu'au 11 juin 2025.

Prophylaxie et méthodes alternatives

Dans le cadre du plan Ecophyto II+ et d'une lutte phytosanitaire la moins impactante possible, il faut privilégier avant toute chose **les mesures prophylactiques et le recours aux méthodes alternatives**.

Se référer au site EcophytoPic : https://ecophytopic.fr/

Note de service DGAL/SDQSPV pour la liste actualisée des produits de biocontrôle
https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière.

De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'actions différents, alternance des modes d'action au sein d'un programme et/ou au fil des saisons, mosaïque spatiale.

Lien vers la note mise à jour février 2025 : https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2024-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne

Lien vers le Site R4P (état des lieux des résistances) : https://www.r4p-inra.fr/fr/notes-communes/

Notes biodiversité et réglementaire

Protection des pollinisateurs : REGLEMENTATION

Depuis le 1er janvier 2022, les **conditions d'autorisation et d'utilisation** des produits phytopharmaceutiques en période de floraison pour certaines cultures ainsi que l'étiquetage de ces produits sont encadrés par l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces conditions visent aussi bien les insecticides et acaricides que les fongicides et herbicides, ainsi que les adjuvants.

Plus d'informations ICI

LIEN NOTE NATIONALE AMBROISIE
LIEN NOTE DATURA

Vu dans les vignes :

Feuille bien prise par le mildiou au niveau d'un entre-cœur, en Beaujolais (Crédit photo : CA 69)

Oïdium « frais » sur Témoin Non Traité, en Beaujolais (Crédit photo : CA 69)

Tache de botrytis sur feuilles en Beaujolais (crédit photo : Soufflet vigne)

Vignoble Beaujolais – Coteaux du Lyonnais

Données du réseau : parcelles renseignées 27 sur 34

Stades phénologiques

Cépages	Le plus tardif	Majoritaire	Le plus avancé
Chardonnay	Mi-floraison	Nouaison	Baies taille de grains de pois
Gamay	Début floraison	Fin floraison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)

Résumé :

Stades phénologiques :
Pour le Gamay, les stades observés vont de Mi-floraison à Grains de la taille d'un plomb.
Pour le Chardonnay, les stades observés vont de Fin floraison à Grains de la taille d'un pois.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

MILDIOU SUR **FEUILLES** / 100 F	Nombre de parcelles notées **25**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	3	12%
0-1	3	12%
1-10	7	28%
>10	12	48%

MILDIOU SUR **GRAPPES** / 100 G	Nombre de parcelles notées **27**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	12	45%
0-1	3	11%
1-10	7	26%
>10	2	7%

Les taches sur feuilles liées aux pluies allant jusqu'au 5 juin sont visibles, les attaques sont parfois assez virulentes, notamment sur les jeunes feuilles qui n'étaient pas protégées lors de ces épisodes pluvieux. Sur grappes, l'impact de ces pluies n'est pas encore visible, mais celui-ci devrait être limité en raison de la protection utilisée depuis le début d'année.
Concernant les pluies du 6-7-8 juin, les symptômes seront visibles sur feuilles d'ici vendredi. Sur grappes, il faudra attendre la fin de semaine prochaine pour faire un bilan.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

OIDIUM SUR FEUILLES / 100 F	Nombre de parcelles notées **19**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	12	63%
0-5	6	32%
5-10	0	0%
>10	1	5%

En Beaujolais, l'oïdium semble se réveiller dans certains Témoins Non Traités. Pour l'instant il y a uniquement des symptômes sur les feuilles, rien sur les grappes.
En Coteaux du Lyonnais, peu d'évolution depuis la semaine dernière.

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F	Nombre de parcelles notées **25**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	3	12%
0-1	8	32%
1-10	9	36%
>10	5	20%

Il est encore trop tôt pour voir les conséquences des pluies de la semaine dernière, mais la situation devrait évoluer d'ici la semaine prochaine. Avec les températures actuelles, il faut compter 10-15 jours entre une pluie et l'apparition des symptômes.

Cicadelle de la flavescence dorée :

Des larves continuent d'être observées. Pour l'instant pas de larve au stade L3 observée.

<u>Zones à 2 ou 3 traitements obligatoires en agriculture conventionnelle :</u>
T1 du 05/06 au 12/06
T2 du 19/06 au 26/06
T3 du 19/07 au 26/07

Vignoble Forez - Roannais

Données du réseau : parcelles renseignées 6 sur 6

Stades phénologiques

Cépages	Le plus tardif	Majoritaire	Le plus avancé
Chardonnay (2 parcelles)		Mi-floraison	
Gamay	Début floraison	Mi-floraison	Nouaison

Résumé :

Stades phénologiques :
Les stades moyens observés sur le vignoble vont de Mi floraison à nouaison.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Peu d'évolution cette semaine, pas de nouvelle sortie de tache sur feuille… En raison des dernières pluies, il est possible d'observer cette fin de semaine des sorties sur grappes.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Peu d'évolution de symptômes mais la vigne est à un stade de forte sensibilité et le nombre de spores dans l'air d'après les modélisations est important.

Black rot (*Guignardia bidwellii*)



Peu d'évolution également du black rot sur feuilles. Des contaminations sont encore en cours suite aux pluies de la semaine passée. Le risque est élevé sur les parcelles sensibles, à surveiller.

Cicadelle de la flavescence dorée :

Des larves de cicadelles ont été observées sur 2 parcelles du Forez.

Vignoble Côtes du Rhône nord

Données du réseau : parcelles renseignées 30 sur 34

Stades phénologiques

Cépages	Le plus tardif	Majoritaire	Le plus avancé
Marsanne	Mi-floraison	Nouaison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)
Roussanne (2 parcelles)	Mi-floraison		Nouaison
Syrah	Fin floraison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)	Baies taille de grains de pois
Viognier	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)

Résumé :

Stades phénologiques :
Les stades vont cette semaine de fin floraison à grains à taille de pois pour les parcelles les plus précoces.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

MILDIOU SUR FEUILLES / 100 F	Nombre de parcelles notées **21**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	15	71%
0-1	2	10%
1-10	4	19%
>10	0	

Quelques rares nouvelles tâches sont visibles cette semaine. Les anciennes taches sont le plus souvent grillées, mais encore actives sur la face inférieure. Des passages sur rafle ont pu être observés de manière très rare également.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

OIDIUL SUR FEUILLES / 100 F	Nombre de parcelles notées **19**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	12	63%
0-5	6	32%
5-10	0	
>10	1	5%

Une progression des symptômes est visible sur les parcelles sensibles.

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F	Nombre de parcelles notées **17**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	2	12%
0-1	6	35%
1-10	5	29%
>10	4	24%

Il semble que les symptômes n'aient pas progressés de manière générale sur le vignoble.

Tordeuses de la grappe :

Peu de glomérules sont visibles (ou sans chenilles). Pour l'instant pas de nouveaux piégeages d’eudémis, mais présence d’eulia sur une parcelle.

Cicadelle de la flavescence dorée :

Des larves de cicadelles sont observées stades L2 et L3.

Vignoble Diois

Données du réseau : parcelles renseignées 22 sur 22

Stades phénologiques

Cépages	Le plus tardif	Majoritaire	Le plus avancé
Aligoté (1 parcelle)		Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)	
Clairette	Boutons floraux séparés	Mi-floraison	Fin floraison
Muscat	Mi-floraison	Fin floraison	Nouaison

Résumé :

Stades phénologiques :

La floraison se termine sur les Muscats et se poursuit sur les Clairettes

- Dans les secteurs les plus précoces, les Muscats sont au stade « baies grains de plomb ». Les Clairettes sont au stade « fin floraison ».
- Dans le Bas Diois, les Muscats sont au stade « nouaison ». Les Clairettes sont au stade « mi-floraison ».
- Dans le Haut Diois, les Muscats sont au stade « fin floraison » et les Clairettes au stade « début floraison ».

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Peu d'évolution des symptômes cette semaine. Le risque reste fort en cas de pluie ou rosées.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Aucun symptôme observé à ce jour. La vigne est dans sa période de grande sensibilité.

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F	Nombre de parcelles notées **22**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	13	59%
0-1	6	27%
1-10	3	14%
>10	0	

La maladie a peu progressé depuis la semaine dernière.

Cicadelle de la flavescence dorée :

Des larves de cicadelles sont observées.

Vignoble Savoie – Bugey – Balmes dauphinoises

Données du réseau : parcelles renseignées 28 sur 30

Stades phénologiques

Cépages	Le plus tardif	Majoritaire	Le plus avancé
Altesse (3 parcelles)	Nouaison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)
Chardonnay	Fin floraison	Nouaison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)
Gamay (2 parcelles)	Nouaison		Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)
Jacquère (2 parcelles)	Nouaison		Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)
Mondeuse (2 parcelles)		Nouaison	

Résumé :

Stades phénologiques :
Après une semaine chaude mais aussi pluvieuse, favorisant la croissance végétative, le vignoble se situe entre le stade fin floraison (BBCH68) et le stade baies taille grains de plomb (BBCH73).
Cette semaine s'annonce chaude et sèche, ce qui devrait assainir le vignoble.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

MILDIOU SUR FEUILLES / 100 F	Nombre de parcelles notées **24**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	7	29%
0-1	5	20,5%
1-10	17	70,5%
>10	0	

En ce qui concerne le mildiou quelques rares nouvelles taches ont été observées mais les symptômes sont essentiellement sur feuilles, et les fréquences et intensités d'attaques restent faibles.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Enfin pour l'oïdium, toujours rien sur les vignes du réseau et en dehors !

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F	Nombre de parcelles notées **28**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	14	50%
0-1	4	14%
1-10	9	32%
>10	1	4%

Pour ce qui est du Black Rot, il est nettement plus visible sur le vignoble en fréquence et en intensité mais cela reste marginal. Hors réseau, sur certains secteurs très sensibles, un fort développement de la maladie peut être observé, lié à des défauts dans la protection.

Tordeuses de la grappe :

Pour les vers de la grappe, sur certaines parcelles, ont été observées des glomérules (entre 11 et 24 glomérules pour 100 grappes). Rien d'alarmant pour le moment.

Cicadelle de la flavescence dorée :

Des larves au stade L3 ont été observées. Nous entrons dans la première semaine de traitement obligatoire contre les larves de cicadelles de flavescence dorée, qui restent très discrètes pour le moment.

Vignoble Sud Ardèche

Données du réseau : parcelles renseignées 36 sur 41

Stades phénologiques

Cépages	Le plus tardif	Majoritaire	Le plus avancé
Chardonnay	Nouaison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)	Baies taille de grains de pois
Grenache N	Fin floraison	Nouaison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)
Merlot	Fin floraison	Nouaison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)
Syrah	Mi-floraison	Fin floraison	Baies taille de grains de plomb (2 à 5 mm)

Résumé :

La semaine dernière, les conditions météos de début semaine étaient très humides avec des faibles précipitations sur l'ensemble de département. Cependant, les conditions de fin de semaine étaient très ensoleillées avec du vent du nord.
Cette semaine s'annonce très favorable pour la vigne avec des températures élevées, dépassant les 30°C et faible risque de précipitations.

Stades phénologiques :
La floraison est finie sur une grande partie du territoire. Nous observons majoritairement le stade BBCH 75 (stade baies à taille de pois) sur les parcelles plus précoces et BBCH 71-73 (nouaison ; baies à taille de grains de plomb) sur les plus tardives.
Certaines parcelles de grenache montrent quelques grappes avec de la coulure, mais le potentiel de récolte reste très élevé.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

MILDIOU SUR FEUILLES / 100 F	Nombre de parcelles notées **35**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	28	80%
0-1	0	
1-10	4	11%
>10	3	9%

MILDIOU SUR **GRAPPES** / 100 G	Nombre de parcelles notées **33**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	29	88%
0-1	0	
1-10	4	12%
>10	0	

Faible évolution des symptômes cette semaine. Les parcelles observées montrent des tâches plutôt sèches sans nouveau repiquage. L'évolution sur les grappes suit son cours faiblement.
Le risque est moyen sur les parcelles avec symptômes et faible sur les parcelles sans symptômes de maladies. Même si les conditions météos ne sont pas favorables au développement de la maladie, il faut rester vigilant.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Un nouveau foyer est apparu sur Bourg Saint Andéol sur une parcelle en agriculture Biologique, avec une faible intensité d'attaque sur feuille. Les reste des parcelles du réseau ne montrent pas de symptôme.
Malgré des fréquences de contaminations faibles, le risque reste fort (selon les OAD).

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

NOMBRE FEUILLES ATTEINTES / 100 F	Nombre de parcelles notées **36**	% parcelles (sur parcelles notées)
Absence	27	75%
0-1	1	3%
1-10	5	14%
>10	3	8%

Les symptômes continuent leur évolution sur feuille et sur grappe sur l'ensemble du territoire.
Cette semaine le risque est fort sur les parcelles déjà contaminées et contexte parcellaire humide et faible sur les parcelles indemnes.

Tordeuses de la grappe :

Une forte apparition des glomérules sur les communes de Payzac, Rosières et Lablachère ont été vu pendant le début de floraison avec des intensités d'environ 20 à 30%. Nous attendons le début de vols de la G2 prochainement.

Cryptoblabes :

Les vols continuent sur les communes de St Marcel d'Ardèche, St martin d'Ardèche et St Just d'Ardèche. Pas de vols sur le reste des communes suivies.

Cicadelle de la flavescence dorée :

Des larves ont été observées.

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les données compilées correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Prochain bulletin 17 juin 2025

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.
https://ecophytopic.fr/

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
Coordonnées du référent : Perrine VAURE (CRAAURA) perrine.vaure@aura.chambagri.fr
Animateur filière/Rédacteur : Juliette SARRAZIN – juliette.sarrazin@rhone.chambagri.fr / Marie-Marie CARCAILLET - marie-marie.carcaillet@rhone.chambagri.fr

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, FREDON-AURA, ADABIO, Agribio Rhône et Loire, Groupe Oxyane, C.A.M.B, GAIC CHOLAT, Soufflet Vigne, Ecovigne, Groupe Perret, Oedoria, Vignerons des Pierres Dorées, Vinescence, Vignerons Ardéchois, Cellier des Gorges de l'Ardèche, Cave de Tain l'Hermitage, Cave de Die Jaillance, Cave de Saint-Désirat, Cooptain, Experenn, Groupe Bernard, Latour Ardèche, EPL Olivier de Serres / Ferme expérimentale Le Pradel, Fédération des caves coopératives en Beaujolais, Syndicat des Vins de Savoie.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Action du plan Écophyto II +, piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la Biodiversité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ