Bulletin de Santé du Végétal

Edition Auvergne-Rhône-Alpes

Territoire rhônalpin

n° 16

Date de publication

22 juillet 2025

Viticulture

Crédit photo : Réseau des Chambres d'Agriculture

À retenir cette semaine

La totalité des parcelles a maintenant atteint la fermeture complète de la grappe (BBCH 79). De nombreuses parcelles ont débuté leur véraison (BBCH 81), allant jusqu'à mi-véraison en secteurs et cépages précoces (BBCH 85).

Mildiou : L'activité du mildiou reste d'actualité, bien que son intensité varie selon les conditions locales. Les récentes précipitations ont pu relancer certaines sporulations. Toutefois, la sensibilité des grappes diminue progressivement avec l'avancée de la véraison, ce qui limite les risques de dégâts sur baies. Globalement le risque est jugé faible à modéré, mais une vigilance reste de mise, surtout au vu des précipitations prévues dans les prochains jours.

Oïdium : L'évolution reste globalement faible. Les symptômes sont peu nombreux et souvent cantonnés aux parcelles sensibles. On note toutefois une petite augmentation dans le Beaujolais et les Coteaux du Lyonnais là où dans le Diois la présence de symptômes semble s'être calmée. Le risque reste présent jusqu'à la véraison, notamment sur cépages sensibles, malgré une pression globalement bien maîtrisée.

Black rot : Présent de manière localisé sur grappes, avec une fréquence faible à modérée selon les vignobles. Dans les zones plus humides ou récemment touchées, le risque demeure modéré, en particulier tant que les baies n'ont pas atteint la véraison et restent donc sensibles.

Cicadelle de la flavescence dorée : Le vol des adultes est en cours dans plusieurs vignobles. La présence de larves est également signalée. En cas de doute, concernant un pied flavescent, il est recommandé de contacter FREDON ou la chambre d'agriculture locale.

Tordeuses de la grappe : Le vol de la deuxième génération est en cours, voire terminé selon les secteurs. Des perforations sont observées dans plusieurs vignobles et l'on note également la présence d'Eulia dans quelques pièges. Aucun papillon Cryptoblabes piégé.

Prévision météo (météo France tendances) :

Cette semaine : La semaine s'annonce instable avec des orages fréquents, parfois accompagnés de fortes précipitations. Les températures resteront estivales, autour de 28 à 32°C, avec une amélioration progressive attendue pour le week-end.

Semaine prochaine : Les conditions devraient être assez sèches et faiblement perturbées avec des températures proches des normales de saison.

BSV réalisé en fonction des observations de la situation sanitaire des vignobles à partir des données de la base Vigicultures 2.0 pour les vignobles suivis dans le cadre du réseau de parcelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Observations effectuées par les membres du réseau BSV en application du protocole harmonisé national d'observations.
L'analyse de risque s'appuie localement, lorsque disponible, sur l'utilisation de modèles de simulation : Milstop, Decitrait, Rimpro…

Cette année, le réseau comprend 165 parcelles observées par 40 observateurs sur 29 cépages différents.
120 parcelles observées jusqu'au 22 juillet 2025.

Prophylaxie et méthodes alternatives

Dans le cadre du plan Ecophyto II+ et d'une lutte phytosanitaire la moins impactante possible, il faut privilégier avant toute chose **les mesures prophylactiques et le recours aux méthodes alternatives**.

Se référer au site EcophytoPic : https://ecophytopic.fr/

Note de service DGAL/SDQSPV pour la liste actualisée des produits de biocontrôle
https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière.

De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'actions différents, alternance des modes d'action au sein d'un programme et/ou au fil des saisons, mosaïque spatiale.

Lien vers la note mise à jour février 2025 : https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2024-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne

Lien vers le Site R4P (état des lieux des résistances) : https://www.r4p-inra.fr/fr/notes-communes/

Notes biodiversité et réglementaire :

Ces notes illustrées, pédagogiques, et enrichies de témoignages de professionnels constituent un outil important dans la perspective globale du changement des pratiques agricoles.

LIEN FICHE POPILLIA JAPONICA

Vu dans les vignes :

Oïdium sur Chardonnay dans le Témoin Non Traité de Ville-sur-Jarnioux ; Crédit photo : AgriBio Rhône et Loire



Fourmis se nourrissant du miellat produit par une cochenille sur vigne ; Crédit photo : CA 69.

Théridion ovoïde sur feuille de vigne avec mildiou sporulé ; Crédit photo : CA 69.

Vignoble Beaujolais – Coteaux du Lyonnais

Données du réseau : parcelles renseignées 26 sur 34

Stades phénologiques

Cépage	Nombre d'observations	Stade le moins avancé	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
CHARDONNAY	6	Fermeture	Fermeture	Début véraison
GAMAY	20	Début fermeture	Fermeture	Début véraison

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Mildiou - Fréquence sur feuille (% de feuilles touchées)	Nombre de parcelles notées	% de parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	3	17.6 %
0–1	1	5.9 %
1–10	4	23.5 %
>10	9	52.9 %

Mildiou - Fréquence sur grappes (% de d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	4	15.4 %
0–1	0	0.0 %
1–10	1	3.8 %
>10	21	80.8 %

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	4	15.4 %
0–5	4	15.4 %
5–20	10	38.5 %
>20	8	30.8 %

En Beaujolais et Coteaux du Lyonnais, depuis la semaine dernière, les symptômes sur grappes et sur feuilles ont très peu évolué. En revanche, certaines vieilles taches re-sporulent suite aux pluies de ce week-end.

Les potentielles taches sur feuilles liées aux pluies du 19-20-21 juillet devraient sortir entre demain et vendredi. Sur grappes, les potentiels symptômes se verraient dans 15 jours. Les dégâts sur grappes devraient être très limités du fait qu'une grande partie des parcelles étaient a minima au stade fermeture lors des pluies.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Oïdium - Fréquence sur grappe (% d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	20	76.9 %
0–5	4	15.4 %
5–20	1	3.8 %
>20	1	3.8 %

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	20	80 %
0–5	4	16 %
5–20	0	0 %
>20	0	0 %

En Beaujolais et Coteaux du Lyonnais, hormis sur quelques ceps où il était déjà bien installé, l'oïdium a très peu évolué depuis la semaine dernière.

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

BR - Fréquence sur grappes (% d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	20	76.9 %
0–1	0	0.0 %
1–5	5	19.2 %
>5	1	3.8 %

BR - Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	19	76 %
0–1	4	16 %
1–10	2	8 %
>10	0	0 %

En Beaujolais, aucune évolution des symptômes sauf sur le Témoin Non Traité à Morancé, a priori les symptômes seraient dus aux pluies 2-3 juillet. Concernant les pluies du 19-20-21 juillet, si il y a eu des contaminations, elles se verront d'ici 15 jours (donc lors de la première semaine d'août).

En Coteaux du Lyonnais, aucune évolution des symptômes.

Tordeuses de la grappe :

En Beaujolais, le vol d'Eudémis semble sur la fin, avec qu'un seul papillon capturé à Saint Vérand lors de la semaine écoulée. Les perforations sont maintenant bien visibles, mais reste en dessous du seuil d'intervention (sur les parcelles observées).

Idem en Coteaux du Lyonnais.

Flavescence dorée :

Des cicadelles adultes et des pieds symptomatiques peuvent être observés dans le vignoble.
Le troisième traitement est en cours.

Vignoble Forez - Roannais

Données du réseau : parcelles renseignées 6 sur 6

Stades phénologiques

Cépage	Nombre d'observations	Stade le moins avancé	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
CHARDONNAY	2	Fermeture	Fermeture	Fermeture
GAMAY	4	Début véraison	Début véraison	Début véraison

Le stade moyen sur le vignoble est globalement à fermeture (BBCH79), le début de véraison est timide un peu partout.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Mildiou - Fréquence sur grappes (% de d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées)	"%"
Absence	1	16.7	%
0–1	0	0.0	%
1–10	3	50.0	%
>10	2	33.3	%

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées)	"%"
Absence	1	16.7	%
0–5	3	50.0	%
5–20	2	33.3	%
>20	0	0.0	%

Pas de nouvelles sorties sur grappes observées. Les pluies de ce week-end risquent de provoquer une nouvelle sortie sur feuilles mais les grappes deviennent moins sensibles. Le temps sec assainit la situation. Le risque devient faible.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Pas de symptômes d'oïdium sur le vignoble.

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

On observe quelques vieux symptomes avec picnydes sur grappes.

Tordeuses :

Les perforations sont d'avantages visibles sur de nombreuses parcelles avec des fréquences assez importantes (16 % sur une parcelle). Le vol des adultes de la G2 semble être terminé.

Vignoble Côtes du Rhône nord

Données du réseau : parcelles renseignées 18 sur 34

Stades phénologiques

Cépage	Nombre d'observations	Stade le moins avancé	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
MARSANNE	2	Fermeture	Fermeture	Fermeture
ROUSSANNE	1	Fermeture	Fermeture	Fermeture
SYRAH	11	Début fermeture	Début véraison	Mi véraison
VIOGNIER	4	Fermeture	Fermeture	Début véraison

Le début véraison (BBCH 81) se généralise pour les Syrah : les parcelles les plus précoces allant de 25 % à 50% de véraison. Pour le viognier, les premiers baies vérées apparaissent alors que pour les autres cépages blancs il faut encore attendre un peu.

Les pluies des 3 derniers jours ont été bénéfiques pour la situation hydrique du vignoble. On relève entre 25 et 35 mm en fonction des secteurs.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Mildiou - Fréquence sur feuille (% de feuilles touchées)	Nombre de parcelles notées	% de parcelles (sur parcelles notées)	"%"
Absence	11	68.8	%
0–1	0	0.0	%
1–10	2	12.5	%
>10	3	18.8	%

Mildiou - Fréquence sur grappes (% de d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées)	"%"
Absence	13	72.2	%
0–1	0	0.0	%
1–10	1	5.6	%
>10	4	22.2	%

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées)	"%"
Absence	11	68.8	%
0–5	4	25.0	%
5–20	1	6.2	%
>20	0	0.0	%

Les contaminations liées aux pluies de la première semaine de juillet (si elles ont été contaminantes) sont maintenant toutes extériorisées sur grappes. Il faut encore un peu pour observer les sorties liées aux pluies du 14 juillet sur grappes. Ces dernières ont provoqué quelques nouvelles taches sur feuilles mais qui ont beaucoup été éliminées par effeuillages.

Concernant les pluies de ce weekend, elles s'extérioriseront sur feuilles entre mercredi et vendredi et dans une quinzaine de jours sur baies.

Des petites pluies sont annoncées pour cette semaine, des repiquages pourraient se produire. Le temps sec par la suite devrait permettre d'assainir la situation. Le risque est faible au vu de l'avancée de la véraison des baies.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Oïdium - Fréquence sur grappe (% d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées)	"%"
Absence	15	83.3	%
0–5	1	5.6	%
5–20	1	5.6	%
>20	1	5.6	%

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées)	"%"
Absence	11	78.6	%
0–5	2	14.3	%
5–20	1	7.1	%
>20	0	0.0	%

La maladie a progressé tant en intensité qu'en fréquence sur les parcelles du réseau tout en restant à des niveaux peu importants. Dans la mesure où le stade fermeture est atteint, le risque est faible.

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

BR - Fréquence sur grappes (% d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	13	72.2 %
0–1	2	11.1 %
1–5	3	16.7 %
>5	0	0.0 %

BR - Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	8	61.5 %
0–1	3	23.1 %
1–10	2	15.4 %
>10	0	0.0 %

Cette semaine de nouveaux symptômes de black-rot sont apparues sur grappes. L'incubation de la maladie étant longue, de nouveaux symptômes peuvent apparaitre. Approchant de la véraison, le niveau de risque est faible.

Tordeuses de la grappe :

On peut facilement observer des perforations dans le vignoble par des chenilles d'Eudémis, si présentes, mais à des niveaux inférieurs aux seuils d'intervention. Les adultes d'Eudémis sont cependant absents des pièges. En revanche, on trouve dans les pièges quelques papilons Eulia.

Vignoble Diois

Données du réseau : parcelles renseignées 20 sur 22

Stades phénologiques

Cépage	Nombre d'observations	Stade le moins avancé	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
ALIGOTE	1	Fermeture	Fermeture	Fermeture
CLAIRETTE	7	Fermeture	Fermeture	Fermeture
MUSCAT A PETITS GRAINS BLANCS	12	Fermeture	Fermeture	Début véraison

Peu d'évolution au niveau de la phénologie cette semaine, les 1ères baies vérées sont observées sur les parcelles de Muscat en secteur précoce. Dans les autres secteurs les Muscats sont au stade fermeture de la grappe.
Les Clairettes du Haut-Diois sont au stade début fermeture et au stade fermeture sur le reste de l'appellation.
Après une première quinzaine de juillet marquée par des conditions chaudes et sèches, les pluies du 19 et 20 juillet ont apporté environ 30 mm sur le vignoble.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Mildiou - Fréquence sur feuille (% de feuilles touchées)	Nombre de parcelles notées	% de parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	15	75 %
0–1	2	10 %
1–10	2	10 %
>10	1	5 %

Mildiou - Fréquence sur grappes (% de d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	17	85 %
0–1	2	10 %
1–10	0	0 %
>10	1	5 %

Observations : Cette semaine, peu d'évolution des symptômes sur feuilles et sur grappes malgré de rares nouvelles taches visibles sur certaines parcelles. Le feuillage est globalement sain.

Risque : Les pluies du 20/07 ont provoqué de nouvelles contaminations (risque faible).

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Oïdium - Fréquence sur grappe (% d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	18	90 %
0–5	1	5 %
5–20	1	5 %
>20	0	0 %

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	15	88.2 %
0–5	2	11.8 %
5–20	0	0.0 %
>20	0	0.0 %

Observations : L'oïdium est globalement bien maîtrisé à ce jour. Les symptômes sont stabilisés.
Risque : Fort jusqu'à la fermeture complète de la grappe puis en baisse jusqu'à véraison et nul à pleine véraison.



Black rot (*Guignardia bidwellii*)

Aucun symptôme observé cette semaine.

Tordeuse de la grappe :

Aucune perforation n'est visible et aucun papillon n'a été capturé.

Cicadelle de la flavescence dorée :

Le vol des adultes est en cours.

Vignoble Savoie – Bugey – Balmes dauphinoises

Données du réseau : parcelles renseignées 11 sur 30

Pas de résumé cette semaine.

Cépage	Nombre d'observations	Stade le moins avancé	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
ALTESSE	1	Début véraison	Début véraison	Début véraison
CHARDONNAY	3	Début véraison	Mi véraison	Mi véraison
GAMAY	2	Fermeture	Fermeture	Mi véraison
JACQUERE	3	Fermeture	Fermeture	Fermeture
MONDEUSE	2	Fermeture	Fermeture	Fermeture

Mildiou - Fréquence sur grappes (% de d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	6	37.5 %
0–1	0	0.0 %
1–10	9	56.2 %
>10	1	6.2 %

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	6	37.5 %
0–5	10	62.5 %
5–20	0	0.0 %
>20	0	0.0 %

BR - Fréquence sur feuilles (% feuilles touchées)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	14	87.5 %
0–1	2	12.5 %
1–10	0	0.0 %
>10	0	0.0 %

BR - Fréquence sur grappes (% d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	14	93.3 %
0–1	1	6.7 %
1–5	0	0.0 %
>5	0	0.0 %

Vignoble Sud Ardèche

Données du réseau : parcelles renseignées 26 sur 41

Conditions météorologiques.

Les précipitations des 3 derniers jours ont entrainé un cumul moyen de 30 à 50 mm sur la zone Sud Ardèche. Sur le mois de juillet, la plupart des secteurs affichent déjà des niveaux de précipitations supérieurs aux moyennes saisonnières. Ces pluies récentes devraient favoriser un bon rechargement des sols et réduire significativement la contrainte hydrique, au moment où le début de la véraison se généralise dans les vignes.

Pour la semaine à venir, les températures devraient rester modérées, ne dépassant pas les 30°C, avec du mistral annoncé en fin de semaine.

Un faible risque de précipitations est également envisagé dans la soirée du 23 juillet.

Stades phénologiques

Cépage	Nombre d'observations	Stade le moins avancé	Stade majoritaire	Stade le plus tardif
CHARDONNAY	10	Fermeture	Début véraison	Début véraison
GRENACHE	6	Fermeture	Fermeture	Début véraison
MERLOT	3	Début véraison	Début véraison	Début véraison
SYRAH	7	Boutons floraux séparés	Fermeture	Début véraison

Le début de la véraison (BBCH 81) se généralise sur l'ensemble du territoire, les cépages et parcelles plus précoces sont bien avancés, la mi-véraison sera probablement atteinte la semaine prochaine.

Les pluies du weekend dernier et celles de cette semaine ont favorisé le démarrage de la végétation sur quelques parcelles plus vigoureuses.

Mildiou (*Plasmopara viticola*)

Mildiou - Fréquence sur grappes (% de d'organes touchés)	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	28	82.4 %
0–1	0	0.0 %
1–10	2	5.9 %
>10	4	11.8 %

Intensité sur grappe	Nombre de parcelles notées	% parcelles (sur parcelles notées) "%"
Absence	26	81.2 %
0–5	6	18.8 %
5–20	0	0.0 %
>20	0	0.0 %

Pas de nouveaux symptômes sur les parcelles du réseau. Faible évolution des contaminations sur feuilles et fruits, la plupart des symptômes sont secs. Les dernières précipitations ont pu engendrer des nouvelles contaminations sur feuilles. Le raisin devient moins sensible à la maladie au vu de l'avancée de la véraison.

Des faibles précipitations sont annoncées cette semaine. Le risque est faible selon les conditions météorologiques actuelles, l'évolution des symptômes et le stade phénologique à ce jour.

Oïdium (*Erysiphe necator*)

Faible évolution des symptômes sur les parcelles du réseau. La maladie est présente surtout sur cépages sensibles et le niveau d'intensité reste toujours faible. Le risque diminue progressivement cette semaine (selon les OAD).

Black rot (*Guignardia bidwellii*)

Pour une grande majorité des parcelles du réseau, l'évolution de la maladie est très faible.

Cette semaine, le risque est moyen sur les parcelles déjà contaminées et au contexte parcellaire humide, et faible sur les parcelles indemnes ou dans des conditions sèches.

Tordeuses de la grappe (Eudémis) :

Surveillance : Payzac, Lablachère et Rosières

Situation actuelle : Nous attendons le vol de la G2 sur les zones affectées.

Cryptoblabes :

Surveillance : St-Marcel-d'Ardèche, St-Montant, Bourg-St-Andéol, St-Just-d'Ardèche, St-Martin-d'Ardèche, Orgnac, Beaulieu, Payzac, Lablachère.

État actuel : Pas de vol la semaine dernière.

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les données compilées correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Dernier bulletin 2025

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.
https://ecophytopic.fr/

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
Coordonnées du référent : Perrine VAURE (CRAAURA) perrine.vaure@aura.chambagri.fr
Animateur filière/Rédacteur : Marie-Marie CARCAILLET - marie-marie.carcaillet@rhone.chambagri.fr

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, FREDON-AURA, ADABIO, Agribio Rhône et Loire, Groupe Oxyane, C.A.M.B, GAIC CHOLAT, Soufflet Vigne, Ecovigne, Groupe Perret, Oedoria, Vignerons des Pierres Dorées, Vinescence, Vignerons Ardéchois, Cellier des Gorges de l'Ardèche, Cave de Tain l'Hermitage, Cave de Die Jaillance, Cave de Saint-Désirat, Cooptain, Experenn, Groupe Bernard, Latour Ardèche, EPL Olivier de Serres / Ferme expérimentale Le Pradel, Fédération des caves coopératives en Beaujolais, Syndicat des Vins de Savoie.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Action du plan Écophyto II +, piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la Biodiversité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ