

N°20
21 juillet
2026

Cultures fruitières

À retenir cette semaine

Prochain BSV : mardi 04 août 2026

- **Olivier** : lien vers le BSV <https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/bulletins-de-sante-du-vegetal-bsv-r267.html>
- **Toutes espèces**
 - **Vigilance *Bactrocera dorsalis* et *Popillia japonica*** (1^{ère} détection en juin en BFC et PACA)
 - **Punaises diaboliques** : Risque très élevé. Émergence d'adultes de 1^{ère} génération en cours.
 - **Mouche méditerranéenne** : aucune capture à ce jour.
 - **Auxiliaires** : populations actives en baisse.
- **Pêcher-abricotier** :
 - **Forficule** : morsures visibles, risque élevé.
 - **Maladie de conservation** : risque faible mais attention en cas d'orages ou averses.
 - **Bactériose à *Xanthomonas*** : présence de dégâts sur feuilles de pêcher. Vigilance en cas d'orage ou averses.
 - **Coryneum, tavelure** : présence de dégâts, risque nul sans pluie, vigilance en cas d'orage ou averses.
 - **Tordeuse orientale** : fin du vol de deuxième génération. Les prises sont globalement faibles.
 - **Anarsia** : vol en baisse, mais dépassement de seuil visible dans une parcelle.
 - **ECA** : symptômes estivaux visibles.
- **Pêcher** :
 - **Cicadelles** : populations d'adultes et de larves en baisse.
 - **Thrips** : présence sur les parcelles du réseau, mais aucun dégât.
- **Cerisier** :
 - **Maladie de conservation** : risque faible sans pluie, vigilance en cas d'orages ou averses.
 - **Coryneum, anthracnose** : évolution à surveiller pendant l'été.
- **Pommier** :
 - **Tavelure** : risque nul sans pluie, vigilance si orage en cas de taches.
 - **Alternariose** : symptômes visibles, vigilance vis-à-vis des défoliations.
 - **Pucerons lanigères** : remontées sur pousses à surveiller si absence d'auxiliaires.
- **Poirier** :
 - **Tavelure** : risque si pluie à partir de taches et chancres
 - **Psylle** : aspersion et séchage à alterner durant la période de chaleur
 - **Folletage** : présence
- **Pommier-poirier** :
 - **Carpocapse** : Poursuite du 2nd vol. Période à haut risque de pontes de G2 terminée en toutes zones de Moyenne Vallée du Rhône ainsi qu'en zones précoces de Rhône-Loire. En cours en Savoie/Haute-Savoie et zones moyennes et tardives de Rhône-Loire. Période de pic d'éclosions de G2 en cours en zones moyennes et tardives de Moyenne Vallée du Rhône, en toutes zones de Rhône-Loire et en zones précoces de Savoie/Haute-Savoie.
 - **Tordeuse orientale** : Troisième vol en cours. Captures en hausse.
- **Noyer**
 - **Carpocapse** : vol de deuxième génération en cours.
 - **Mouche du brou** : vol en cours.
 - **Bactériose** : dégâts visibles.
- **Châtaignier** :
 - **Tordeuse** : vol en diminution. Présence de dégâts sur bogues.
- **Agenda** :
 - **Colloque national DEPHY arbo** : 2 et 3 décembre 2026, voir en fin de BSV.

Crédit photo : Réseau des Chambres d'Agriculture, Réseau FREDON Rhône-Alpes



Ce BSV est réalisé à partir des observations effectuées le lundi 29 juin (relevés punaises facultatifs) et 6 juillet par les observateurs sur les parcelles de référence.



PROTECTION DES POLLINISATEURS

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d'autorisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison pour certaines cultures ainsi que l'étiquetage de ces produits sont encadrés par l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces conditions visent aussi bien les insecticides et acaricides que les fongicides et herbicides, ainsi que les adjuvants. Pour plus d'informations : [ICI](#).



NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ

• NOTE NATIONALE COLÉOPTÈRES

La Note nationale Coléoptères propose une synthèse de 2 pages pour présenter le rôle de ces insectes dans l'agroécosystème. Elle décrit notamment leurs caractéristiques, leur diversité, leur rôle de décomposeurs, pollinisateurs, et régulateurs. Le document présente également des éléments clefs pour leur observation, des recommandations agronomiques, et des liens vers des documents de référence pour mieux les connaître. Consultez la Note nationale Coléoptères en cliquant sur l'image ci-contre.



L'ensemble des Notes nationales Biodiversité sont consultables sur le site ECOPHYTO PIC :

<https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/notes-nationales-biodiversite>



PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

• AMBROISIE

Les pollens d'ambroisie, émis majoritairement en août-septembre, provoquent de fortes réactions allergiques (rhinite, conjonctivite, asthme...) chez les personnes sensibles. Ces affections peuvent toucher n'importe quel individu, notamment en cas d'exposition intense, répétée ou prolongée. En 2019, un tiers des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes a eu des signalements d'ambroisie sur leur territoire (source : plateforme « Signalement ambroisie »).

Contrôler la présence d'ambroisie chaque année, avant sa floraison, c'est agir pour la santé de tous !

Les secteurs agricoles sont fortement impactés par l'ambroisie, il est nécessaire d'agir pour restreindre sa progression sur le territoire.

Une plaquette est disponible, à destination notamment des agriculteurs et des partenaires techniques, et reprend les principaux leviers de lutte préventive et curative à mobiliser pour maîtriser efficacement contre l'ambroisie en milieu agricole :

- Les éléments de reconnaissance de l'ambroisie ;
- La lutte en culture ;
- La lutte en interculture ;
- Le nettoyage des engins agricoles.

Des référents sont formés dans les communes pour répertorier les signalements et accompagner la lutte.

Pour plus d'informations, consultez : <https://ambroisie.fredon-aura.fr/>

Consultez également la Note Nationale Ambroisie présente à la fin de ce bulletin.



Ambrosie au stade plantule (à gauche) et végétatif (à droite) – FREDON AURA

• **DATURA STRAMONIUM**

Datura stramonium est une plante de la famille des Solanacées à impact sur la santé humaine (toxicité). Une fois une population installée, l'éradication complète du datura est complexe. La surveillance et la prévention sont donc essentielles afin d'agir dès le début de l'infestation.

Pour en savoir plus :

<https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/fiches-de-reconnaissance-des-especes-de-datura-a6045.html>

PRÉVISIONS MÉTÉO

D'après les prévisions Météo France de la semaine pour le territoire rhônalpin (au 21/07/26 à 9h30) : Des conditions chaudes et ensoleillées persisteront jusqu'à vendredi, avec l'arrivée d'un régime d'averses parfois accompagné d'orages, pour le week-end sur l'ensemble de la région. Les températures seront comprises entre 22°C le matin et 33°C l'après-midi. Des orages pourront éclater vendredi localement, et des averses seront possibles durant le week-end.

Les prévisions peuvent changer au fil des jours : elles sont à consulter localement régulièrement de façon à réévaluer le risque associé au plus proche de vos parcelles, pour les différents bioagresseurs figurant dans ce BSV.

TOUTES ESPÈCES

• **VIGILANCE CONCERNANT LES INSECTES XYLOPHAGES**

Cf. BSV n°05 du 31/03/2026

• **PUNAISES DIABOLIQUES**

Situation :

Des adultes hivernants étaient visibles dans 15 des 18 pièges suivis le 20 juillet, avec :


- 1 à 40 captures sur pommier dans 4 pièges de Rhône-Loire, 3 pièges de Moyenne Vallée du Rhône et 1 piège de Savoie/Haute-Savoie,
- 4 à 24 captures sur poirier dans 4 pièges de Savoie/Haute-Savoie,
- 6 à 23 captures sur pêcher dans un piège de Moyenne Vallée du Rhône et un piège de Rhône-Loire,
- 39 captures dans 1 pièges sur noyer.



D'importantes captures de larves ont été observées dans 11 pièges avec :

- 1 à 52 larves dans 2 pièges suivis en Rhône-Loire, 2 pièges de Moyenne Vallée du Rhône et 1 piège de Savoie/Haute-Savoie sur pommier

- 4 à 91 captures sur poirier dans 4 pièges de Savoie/Haute-Savoie
- 5 larves sur pêcher dans un piège de Moyenne Vallée du Rhône
- 101 captures dans 1 pièges suivis sur noyer



NB : les relevés hebdomadaires sont facultatifs en été (tous les pièges n'ont pas été relevés les 29/06 et 13/07, d'où la baisse de captures totale à ces dates).


Les éclosions, et le développement des larves de G1 se poursuivent. L'émergence d'adultes de première génération est en cours.

La présence d'adultes a été repérée également au sein des arbres dans une parcelle de pêcher et une parcelle de pommier de Moyenne Vallée du Rhône, et également dans une parcelle de poirier et une parcelle de pommier de Savoie/Haute-Savoie. Les parcelles de pommier et poirier de Savoie/Haute-Savoie étaient également concernées par la présence de larves.

Analyse de risque : Nous sommes actuellement dans la période à très haut risque, du fait de l'activité des larves à laquelle va s'ajouter l'activité de nouveaux adultes.



Risque de confusion : Les punaises diaboliques *H. Halys* peuvent être confondues avec *Rhaphigaster nebulosa*. À la différence de *R. nebulosa*, *H. Halys* ne possède pas d'épine ventrale, a des zébrures transversales sur la membrane transparente des ailes, et présente une disposition des anneaux blancs différente autour des articles antennaires.



Extrait de la fiche de reconnaissance d'*H. Halys* INRA/ANSES de 2015

• AUTRES PUNAISES

Situation : Plusieurs espèces de punaises peuvent être actives en même temps que la punaise diabolique et s'attaquer aux fruits pour se nourrir (Cf. photos dans BSV n°12 du 12/05/26). Le 20 juillet, la présence de dégâts a été observé sur 4% des fruits sur une parcelle de pommier en Moyenne Vallée du Rhône.

Analyse de risque : le risque d'activité des punaises sera élevé cette semaine.



• MOUCHE MÉDITERRANÉENNE - CERATITIS CAPITATA

Biologie : Cette mouche très polyphage, qui se développe habituellement dans le sud de la France, peut se déplacer sur de grandes distances, et être rencontrée certaines années dans notre région si les conditions de températures sont favorables (climat chaud et sec). Les femelles pondent leurs œufs sous l'épiderme des fruits par paquets. Les œufs éclosent 2 à 4 jours après, pour des températures chaudes, et 16-18 jours pour des températures fraîches. Le cycle larvaire dure 1 à 2 semaines. À maturité, les larves quittent les fruits et se nymphosent dans le sol. Les adultes émergent une à plusieurs semaines après selon les températures.



Situation : aucune capture n'a été observée à ce jour.

Analyse de risque : Les conditions très chaudes que nous connaissons sont favorables à l'installation de l'insecte. Soyez vigilants en cas de captures, et d'observations de taches marron autour d'un point de piqûre, et de présence d'asticots (7-8 mm de long, partie antérieure effilée avec présence de deux crochets noirs, et partie postérieure tronquée).

Vigilance *Bactrocera dorsalis* :


Pour rappel, un organisme de quarantaine prioritaire a fait l'objet de découvertes d'individus en parcelles de pêcher par piégeage dans le Rhône en 2022 et 2023, dans la Drôme en 2024 puis en Ardèche en 2025 : il s'agit de *Bactrocera dorsalis*.

Aucun foyer n'a cependant été repéré à ce jour (aucun fruit attaqué avec des larves).

Soyez vigilants à tous dégâts suspects avec présence d'asticots (contactez le SRAL ou FREDON AURA en cas de suspicion). Voici ci-contre une photo de la mouche adulte et ses caractéristiques.

Voir également la fiche de reconnaissance de *Bactrocera dorsalis* en cliquant sur le lien :

https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2021-03/Fiche_Diagnostic_DACUDO_Bactrocera_dorsalis.pdf



• SCARABÉE JAPONAIS – POPILLIA JAPONICA

Le Scarabée japonais (*Popillia japonica*), organisme de quarantaine prioritaire au niveau européen, est un insecte très polyphage qui peut s'attaquer à plus de 400 espèces végétales.

Situation : Le scarabée japonais a été détecté pour la première fois dans l'Hexagone au cours de l'été 2025, dans la région Grand Est (départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin). Aucun foyer n'a été identifié sur le territoire mais la surveillance y est renforcée.

Par ailleurs, malgré l'absence de capture de scarabées japonais dans la région, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a émis un arrêté établissant une zone délimitée visant l'éradication de *P. japonica* après la confirmation courant août 2025 d'un foyer dans le canton de Genève (Suisse), à proximité de la ville française d'Annemasse (département de la Haute-Savoie) (Arrêté préfectoral N° 2025/202). La surveillance est donc renforcée dans des zones françaises limitrophes de la Suisse, où il n'y a pas eu de détection à ce jour.

Mais pour cette année 2026, la première détection du scarabée japonais a été faite en Bourgogne-Franche-Comté le 16 juin dans un piège sur la commune d'Écot (interception supposée d'un individu isolé « autostoppeur »).

Le 18 juin, c'est sur la commune de Cannes en région PACA qu'une femelle et un mâle ont également été capturés, dans un piège à proximité d'un axe majeur routier. Il s'agit de la première détection en PACA (interception supposée d'individus isolés « autostoppeurs »).


Dans ces deux régions, la surveillance par piégeage a été immédiatement renforcée et des prospections sont menées par les DRAAF.

Pour en savoir plus :

<https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/popillia-japonica-detecte-dans-le-doubs-communique-de-presse-et-consignes-de-a3779.html>

<https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/premiere-detection-du-scarabee-japonais-popillia-japonica-en-region-paca-a4867.html>

Ces captures nous invitent à redoubler de vigilance. En cas de suspicion, contacter rapidement le SRAL ou FREDON AURA.



Voir également la fiche de reconnaissance de *Popillia japonica* en cliquant sur le lien :

https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2020-05/Note%20nat.%20BSV%20Popillia%20japonica_juillet%202017.pdf

Bulletin d'informations sanitaires de la plateforme ESV n° 2 avec la situation en France et en Europe :

https://plateforme-esv.fr/sites/default/files/2026-06/BS-N%C2%B02_Mai_2026_Popillia-japonica.html

• CICADELLE PRUINEUSE - METCALFA PRUINOSA

Situation : Le 20 juillet, la présence d'adultes et de larves a été observée dans une parcelle de pommier de Moyenne Vallée du Rhône. Des larves ont été observées sur poirier, également en Moyenne Vallée du Rhône.


Analyse de risque : Les populations sont à surveiller durant l'été, en particulier sur jeunes plantations. Les larves sécrètent du miellat favorisant le développement de fumagine. Cet insecte apprécie la chaleur, les conditions météo actuelles sont favorables à l'insecte. Soyez vigilants.

• AUXILIAIRES



Les auxiliaires se font plus rares depuis début juillet sous l'effet de la chaleur et de la baisse globale d'activité des ravageurs qui constituent leurs proies.

Les dernières observations montrent cependant la présence de chrysopes, des syrphes et coccinelles dans certaines parcelles.



⇒ Pour détecter les auxiliaires sur vos parcelles, téléchargez et conservez le **Guide de reconnaissance des principaux auxiliaires en arboriculture** réalisé par la Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes :

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2025-03/2024-11%20Guide%20Auxilaire%20Arbo%20DEPHY%20-%20Chambre%20d%27Agriculture%20des%20Hautes-Alpes%20-%20PRADAL%20Julie.pdf?utm_source=brevvo&utm_campaign=Lettre%20PIC%2098%20Spciale%20DEPHY&utm_medium=email

Voir également des photos dans le BSV n°11 du 05/05/2026.

• COUPS DE SOLEIL

Situation : sous l'effet des fortes chaleurs et exposition prolongées, les coups de soleil sont plus nombreux sur toutes cultures.



Biocontrôle :

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Cf. Note de service DGAL/SDQSPV en cliquant sur le lien :

<http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service>


Des applications de talc sont possibles pour protéger les fruits.

PÊCHER – ABRICOTIER

FORFICULES

Situation : Des dégâts ont été repérés le 20 juillet dans une parcelle d'abricotier et une parcelle de pêcher en Moyenne Vallée du Rhône dans des parcelles proches de la récolte (de 1 % de dégâts).

Analyse de risque : le risque de morsure demeurera élevé cette semaine.



 **Méthode alternative :** la pose de glu est une barrière efficace contre les forficules. Elle doit être en place. Elle peut jouer un rôle également pour empêcher les fourmis de monter (favorables au développement des pucerons).

• FOURMIS

Analyse de risque : Les fourmis peuvent s'attaquer aux fruits pour consommer du liquide sucré. Lors des périodes chaudes, des dégâts sont possibles. Une vigilance particulière est à avoir dans le cas de fortes populations atypiques avec des dégâts conséquents.

Voir la brochure technique d'informations sur les fourmis invasives :

<https://www.fredon.fr/aura/publications/brochures-techniques#Fourmis%20invasives>

Contactez FREDON AURA en cas de suspicions de présence d'invasives.

• MALADIES DE CONSERVATION

Biologie : Les maladies de conservation regroupent les pourritures susceptibles d'être observées à l'approche de la récolte, lors du stockage, et des opérations post-récolte. Parmi elles, figurent majoritairement les monilioses, mais également les maladies dues au développement des champignons *Alternaria* (parasite de blessure), *Botrytis* (parasite de blessure), *Rhizopus* (plus courante en conservation qu'au verger), et *Pénicillium*.

Situation : Les blessures (morsures de forficules, impacts de grêle, microfissures...) peuvent être des portes d'entrée pour les champignons. Aucun dégât n'a été observé sur les parcelles du réseau le 20 juillet lors des comptages à l'approche de la récolte.



Analyse de risque : Une vigilance doit être mise en œuvre au moment de la maturation. Les blessures (microfissures, morsures de forficules etc.) doivent être prises en compte car elles constituent des portes d'entrée pour les champignons. **Le risque sera faible en l'absence de pluie. Il deviendra élevé à partir de samedi si les orages ou averses se confirment. Les blessures de grêle sont favorables au développement de champignons.**


• TORDEUSE ORIENTALE

Situation : Les captures sont globalement faibles. Après le deuxième vol, plusieurs vol successifs peuvent se produire durant l'été, jusqu'au moment de la diapause en octobre.

Résultats des suivis de TORDEUSES ORIENTALES du 20/07/2026 sur abricotier						
secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures

Moyenne Vallée du Rhône	3	1	2	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Résultats des suivis de TORDEUSES ORIENTALES du 21/07/2026 sur pêcher						
secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
Moyenne Vallée du Rhône	12	4	7	0	0	1
Rhône-Loire	3	0	3	0	0	0



Confusion possible : Cf. BSV n°08 du 14/04/2026.



Biocontrôle :


Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Cf. Note de service DGAL/SDQSPV en cliquant sur le lien :

<http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service>

La confusion doit être en place en toutes zones. Cette technique permet d'empêcher la rencontre des mâles et des femelles par la diffusion d'un nuage de phéromones, et de limiter ainsi l'accouplement et la ponte.

• PETITE MINEUSE – ANARSIA LINEATELLA

Situation : Le vol reste globalement faible, néanmoins un dépassement de seuil a cependant été relevé dans une parcelle de Moyenne Vallée du Rhône le 20 juillet. Aucun dégât n'a été observé lors des comptages réalisés proches de la récolte dans 4 parcelles à cette date sur abricots et pêches. Hors réseau, des dégâts sont toujours visibles sur abricots en Moyenne Vallée du Rhône.



Résultats des suivis de PETITE MINEUSE DU PECHER du 21/07/2026 sur abricotier					
secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 30 captures	Nombre de pièges avec plus de 30 captures
Moyenne Vallée du Rhône	8	1	3	3	1
Rhône-Loire	Pas de données cette semaine				

Analyse de risque : en dessous du seuil de 30 captures hebdomadaires, le risque est faible.



Biocontrôle : Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Cf. Note de service DGAL/SDQSPV en cliquant sur le lien : <http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service>

Une confusion à double action Tordeuse orientale – Anarsia existe, elle doit être en place.

• MALADIE DES TACHES BACTERIENNES *XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. PRUNI*

Biologie : la pression de la maladie est forte certaines années en Moyenne Vallée du Rhône, avec l'observation de symptômes sur pêchers mais également sur abricotiers. Les températures chaudes sont favorables à la multiplication de la bactérie, la pluie et le vent sont nécessaires pour sa dissémination.

À moins de 13°C, il faut plus de 25 heures d'humectation pour entrainer une contamination, environ 7 heures d'humectation à 15°C, et environ 5 heures d'humectation à plus de 20 °C.

Situation : la présence de dégâts sur fruits (0,5%) a été observés sur une parcelle de pêcher de Moyenne Vallée du Rhône à l'approche de la récolte.



Analyse de risque : Nous sommes dans la période de sensibilité sur feuilles et fruits. Soyez vigilants, en particulier dans les parcelles attaquées les années précédentes (concerne surtout la Moyenne Vallée du Rhône où la maladie est problématique). **Le risque d'infections est nul en l'absence de pluie. Il pourra devenir fort à partir de samedi en cas d'averses orageuses.**



Prophylaxie : Il est indispensable de mettre en œuvre des mesures prophylactiques dans les zones à risque (source Groupe de Travail *Xanthomonas*)

- Intervenir dans les parcelles saines d'abord, celles ayant présenté des symptômes ensuite
- En fin de travail dès la sortie de parcelle, nettoyer le matériel de tous déchets végétaux (feuilles, fruits, rameaux) et encroûtements de sève sur les sécateurs, les désinfecter et les remiser au sec jusqu'au lendemain.
- Eviter les excès d'azote, et les déficits potassiques, se contenter d'une vigueur moyenne mais correcte
- Lors de l'établissement de jeunes vergers, éviter les systèmes d'irrigation mouillant le bas du feuillage et proscrire l'aspersion sur frondaison, à éviter absolument.

⇒ **Signaler à votre technicien toute nouvelle parcelle suspecte**

• TAVELURE – *CLADOSPORIUM CARPOPHILUM*

Situation : Hors réseau, des dégâts sur abricots sont visibles en Moyenne Vallée du Rhône.

Analyse de risque : La période de sensibilité des fruits se poursuit. Le risque sera nul (jours secs et ensoleillés) à élevé (en cas d'averses avec longue humectation) cette semaine. Surveillez l'évolution des prévisions météorologiques. **A 20°C, il faut 4 h d'humectation pour entrainer un risque moyen, et 8 h d'humectation, pour un risque élevé** (source infos Ctifl juin 2013 sur la modélisation Tavelure du prunier).

• *CORYNEUM BEIJERINCKII*

Biologie : Cf. BSV n°02 du 03/03/2026


Situation : Plusieurs parcelles du réseau restent concernées par la présence de la maladie sur feuilles et fruits. Un comptage réalisé proche de la récolte montrait la présence de 3.5 % de dégâts sur abricots dans une parcelle de Moyenne Vallée du Rhône.

Analyse de risque : Le risque sera nul par temps sec, il deviendra élevé ce week-end si les orages ou averses se confirment.



• VIRUS DE LA SHARKA

Analyse de risque : Les symptômes du virus peuvent être encore visibles sur les feuilles de pêcher et abricotier, et sur fruits, mais ils vont progressivement disparaître avec la chaleur. Il va devenir ensuite plus difficile de repérer les nouveaux arbres malades.



ABRICOTIER

• BACTÉRIOSES À PSEUDOMONAS

Biologie : Cf. BSV n°06 du 31/03/2026

Situation : La présence de la maladie a été observée le 20 juillet sur une parcelle de Moyenne Vallée du Rhône à l'approche de la récolte (1% des fruits touchés).

Analyse de risque : Le risque de progression sera nul par temps sec. Il deviendra élevé en cas d'orages ou d'averses.



 **Prophylaxie :** Coupez les branches atteintes par temps sec, les sortir du verger pour les détruire. Veillez à bien désinfecter vos outils entre chaque arbre ou au moins entre chaque parcelle. Cf. également paragraphe Prophylaxie dans Toutes Espèces et la Fiche technique n° 1 du Guide Ecophyto Fruits dans le BSV n°01.

Le développement de la maladie est limité dans les arbres greffés haut à plus d'1 m sur porte-greffe pêcher.

• ENROULEMENT CHLOROTIQUE DE L'ABRICOTIER

Situation : Pendant la période estivale, les symptômes se présentent sous forme de feuilles de petite taille qui s'enroulent en « cuillère » et qui se décolorent entre les nervures. **La maladie est visible hors réseau en Moyenne Vallée du Rhône.**



Analyse de risque et mesures de lutte : Profitez de la période estivale facilitant le repérage des symptômes pour observer vos parcelles d'abricotier (mais également de pêcher, prunier, amandier pouvant être touchées par la maladie). **En cas de présence, repérez les arbres afin de les arracher avant l'hiver prochain (avant la reprise du vol des adultes psylles hivernants contaminants).**

PÊCHER

• PUCERONS BRUNS – *BRACHYCAUDUS PRUNICOLA*

Situation : aucun foyer n'a été repéré le 21 juillet.


Analyse de risque : le risque d'activité des pucerons sera faible du fait des températures élevées et de la faible hygrométrie actuelle. Soyez cependant vigilant au moment de la baisse des températures et après les averses. Ces pucerons peuvent rester tout l'été sur pêcher (pas de migration sur un hôte secondaire).



• CICADELLES VERTES

Situation : Le 20 juillet, des adultes ont été repérés dans 15 parcelles de Moyenne Vallée du Rhône et Rhône-Loire avec moins de 5 adultes dans 4 parcelles, 11 à 36 adultes dans 10 parcelles, et 160 adultes dans 1 parcelles. 11 de ces parcelles étaient également concernées par la présence de larves (moins de 5 individus dans 5 parcelles, entre 7 et 9 dans 4 parcelles, et 26 à 50 dans 2 parcelles).

Les populations d'adultes et de larves diminuent. Des dégâts sont visibles.



Analyse de risque : les conditions climatiques de la semaine seront très favorables à l'activité des adultes et des larves de cicadelles. Attention aux risques de dégâts.



• THRIPS D'ÉTÉ

Biologie : Plusieurs thrips sont susceptibles de se développer en période de chaleur. Parmi elles, figure *Frankliniella occidentalis*. Cette espèce de Thrips attaque principalement le pêcher à l'approche de la maturité des fruits. Il peut être rencontré sur de nombreuses espèces, et causer quelques dégâts sur abricotier.

Les adultes sont visibles plus fréquemment sur la face inférieure des feuilles. Un petit nombre d'individus suffit pour entraîner des dégâts notables sur fruit (décolorations blanc argentées au niveau de l'épiderme, particulièrement visibles sur les fruits très colorés et peu duveteux). Les parties des fruits les plus atteintes sont celles en contact avec des feuilles, un autre fruit, ou le rameau.

On peut rencontrer d'autres espèces de Thrips, sur les pousses en croissance du pêcher. Les thrips californiens adultes sont de couleur marron clair, et de petite taille 1,3 à 1,4 mm, les larves de couleur blanc-crème sont de même forme mais mesurent 0.5 à 1 mm.

Situation : le 20 juillet, des thrips étaient présents dans 4 parcelles de Moyenne Vallée du Rhône et Rhône-Loire, avec des prises faibles (de 1 à 5 individus). L'identification de l'espèce est difficile. Aucun dégât n'a été signalé sur fruits à l'approche de la récolte.

Analyse de risque : La période à risque est toujours en cours.

 **Prophylaxie :** Il faut veiller à **faucher régulièrement l'enherbement** pour enlever les fleurs, et limiter ainsi les populations. Des fauches trop espacées peuvent provoquer des remontées soudaines et massives de thrips dans les arbres. **Ces remontées peuvent être particulièrement préjudiciables dans les 15 à 20 jours précédant la récolte**



CERISIER

Les parcelles du réseau ont été récoltées.

• MALADIE DU FEUILLAGE - CORYNEUM ET ANTHRACNOSE

Biologie : Cf. paragraphe Abricotier pour *Coryneum*. Les infections par ces champignons sont favorisées par de longues périodes d'humectation.

Situation : certaines parcelles du réseau restent concernées par la présence de coryneum et d'antrachnose (=cylindrosporiose).

Coryneum : les taches de couleur brun-rouge bien circulaires finissent par se nécroser et se détacher pour former des criblures.

Anthrachnose : les symptômes se présentent sous forme de petites taches violacées de 1 à 3 mm parfois anguleuse (couleur lie de vin en face supérieure, brunes en face inférieure). Celles-ci peuvent se rejoindre pour former des plages étendues entre les nervures. En face inférieure, un mucilage blanchâtre peut apparaître. Les feuilles finissent par jaunir en été, et tomber en cas de forte attaque.

Gnomonia : le champignon se développe en mai-juin sur certaines feuilles à la faveur des pluies. Des taches vert pâle apparaissent soit entre les nervures ou le long des bords. Elles deviennent ensuite jaunes à rouges, parfois avec un halo jaune et peuvent également se développer sur les fruits ou les rameaux. Les feuilles s'enroulent, puis sèchent sur l'arbre (ne tombent pas). Les fruits attaqués présentent des lésions brunes, des déformations ou fissures peuvent également survenir. Ce sont surtout les feuilles qui sont concernées. Les arbres affaiblis sont plus sujets à la maladie



Coryneum - FREDON AURA



Anthracnose – FREDON AURA



Anthracnose - CA69

Analyse de risque : Le risque sera nul en l'absence de pluie. Il redeviendra élevé si les orages ou averses se confirment avec une longue humectation.



POMMIER

• TAVELURE

Situation : aucune tache n'a été observée cette semaine sur feuille ou sur fruit.

Biologie : Cf. BSV n°02 du 03/03/2026

Analyse de risque :

La période de contaminations secondaires est en cours. Le risque pourra devenir élevé en fin de semaine à la faveur des averses orageuses (plus de 14 h d'humectation nécessaire).

Le tableau ci-dessous présente les durées d'humectation nécessaires aux infections sur fruits à partir des conidies, sur variétés sensibles pour différentes températures :

T° moyenne pendant l'humectation	10°C	15°C	20°C	25°C
Juillet	35 h	23 h	17 h	14 h
Août	45 h	30 h	22 h	18 h

Les prévisions peuvent changer au fil des jours : elles sont à consulter localement régulièrement de façon à réévaluer le risque associé au plus proche de vos parcelles.



Il existe des résistances de *Venturia Inaequalis* à la famille des Strobilurines et Anilinopyrimidines (ANP). Pour en savoir plus, consulter le site : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

• PUCERONS LANIGÈRES – *ERIOSOMA LANIGERUM*

Situation : le nombre de parcelles concernées par leur réactivation au niveau du collet et des plaies de taille et par des remontées sur pousse a nettement diminué.

Le 20 juillet, des foyers étaient visibles sur une parcelle de Moyenne Vallée du Rhône avec 4% d'arbres touchés au collet, et 40 % de pousses concernées par des colonies. Une parcelle de Savoie/Haute-Savoie était également concernée par la présence de pucerons au collet (5% des arbres).

L'auxiliaire *Aphelinus mali* était présent sur les parcelles (momies de pucerons, et adultes).

Analyse de risque : les remontées sur pousses peuvent progresser cette semaine en l'absence d'auxiliaires. Il demeurera faible en cas de présence de parasitisme par *Aphelinus mali*.



• ALTERNARIOSE

Situation : des symptômes étaient toujours visibles le 20 juillet dans 2 parcelles de Rhône-Loire (5% de feuilles tachées) et 2 parcelles de Moyenne Vallée du Rhône (10% de feuilles tachées).


Les symptômes se présentent d'abord sous forme de taches violacées circulaires, qui grandissent, brunissent et se rejoignent pour former ensuite des plages plus étendues. Les feuilles finissent par jaunir et chuter.



Analyse de risque : Les à-coups climatiques avec des longues humectations après de fortes chaleurs sont favorables à la progression de la maladie, qui s'exprime avec plus d'intensité sur des arbres stressés. Nous sommes dans une période favorable au développement de la maladie. Les variétés type Gala, Chantecler, Breaburn sont sensibles. **Il n'y a pas de risque d'infection en l'absence de pluie, mais vigilance à partir de samedi si les averses se confirment. Les parcelles fortement attaquées peuvent subir des chutes de feuilles avec la période de fortes chaleurs.**

• MALADIE DES CROTTES DE MOUCHE, MALADIE DE LA SUIE

Description : Les symptômes de maladie des crottes de mouche se présentent sous forme de petites taches rondes de 1 à 2 mm, ou plus petites, noires, groupées en amas de taille variable. Ceux de maladie de la suie forment des plages noires, qui à la différence de la fumagine, ne partent pas en frottant. Ces maladies n'induisent pas de pourriture, mais altèrent l'épiderme et peuvent être rencontrées à l'approche de la récolte, en conditions humides. L'incidence négative est visuelle.



Analyse de risque : Les symptômes apparaissent après récolte, mais les contaminations par les champignons responsables se produisent durant le printemps et l'été.

La biologie de ces champignons est cependant mal connue. Le risque d'infection démarre à la floraison et perdure jusqu'à la récolte. Il est accru par un temps pluvieux, une mauvaise aération des arbres, un enherbement abondant. **Le risque sera nul en l'absence de pluie. Des infections seront possibles si les orages ou averses se confirment durant le week-end.**

• PETITE TORDEUSE DES FRUITS – CYDIA LOBARZEWSKII

Situation : aucune capture de *Cydia Lobarzewskii* n'a été observée au sein du réseau le 20 juillet.

Analyse de risque : Des dégâts peuvent survenir dans les parcelles hors confusion carpocapse durant l'été.

Le point d'entrée de la galerie se présente en spirale, la galerie reste propre jusqu'aux pépins à la différence de celle causée par la larve de carpocapse.



POIRIER

• TAVELURE DU POIRIER – *VENTURIA PIRINA*

Analyse de risque : la période de contaminations primaires par les ascospores est terminée. Des infections peuvent se produire lors des pluies à partir des conidies provenant des taches sur feuilles, mais également à partir de celles contenues dans les chancres sur bois. **Surveillez les prévisions d'orages.**

• PSYLLES

Situation : le 20 juillet, une parcelle de Moyenne Vallée du Rhône était concernée par la présence d'adultes (4% de pousses touchées). 2 parcelles de Moyenne Vallée du Rhône étaient concernées par la présence de larves (8% et 56% de pousses touchées).

Méthode alternative : dans les situations de forte pression où un fort développement de larves et de miellat est observé, poursuivre lorsque c'est possible (pas en cas de présence de tavelure), des aspersions sur frondaison en alternant irrigation et séchage par plage de 2 h, de façon à fragiliser les larves. **Les périodes de fortes chaleurs de la semaine sont favorables à une bonne efficacité de cette mesure.**

• AGRILE DU POIRIER – *AGRILUS SINUATUS*

Cf. BSV n°14 du 02/06/2026

• FOLLETAGE

Du folletage peut survenir en cette période de forte chaleur avec un stress hydrique des arbres (feuillage qui noircit, la nervure reste verte). Certaines variétés telles que Conférence sont très sensibles. Soignez l'irrigation.

• PHYTOPTES DES GALLES ROUGES – *ERYOPHYES PYRI*

Situation : La présence de l'insecte n'a pas été signalé cette semaine sur les parcelles suivies.

Analyse de risque : Des conditions chaudes et sèches sont favorables aux phytophtes.




POMMIER-POIRIER

• CARPOCAPSES

Situation : Le deuxième vol se poursuit avec des prises en légère hausse.

Un comptage des dégâts de fin de première génération a été réalisé le 20 juillet sur 2 parcelles de Savoie/Haute-Savoie. L'une d'elle présentaient de faibles dégâts (0,4% de fruits touchés).



Résultats des suivis de CARPOCAPSE du 20/07/2026 sur pommier						
secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
Moyenne Vallée du Rhône	13	9	4	0	0	0
Rhône-Loire	5	1	2	1	1	0
Savoie/Haute-Savoie	5	4	1	0	0	0

Résultats des suivis de CARPOCAPSE du 20/07/2026 sur poirier						
secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
Moyenne Vallée du Rhône	4	3	1	0	0	0
Rhône-Loire	1	1	0	0	0	0
Savoie/Haute-Savoie	4	3	1	0	0	0

Modélisation -situation :

Le modèle Carpocapse du pommier (modèle Inoki DGAL) permet d'estimer le pourcentage des populations, et de prévoir l'évolution des pontes et des éclosions.

Voici les résultats obtenus :

Pourcentage d'avancement estimé par le modèle				
Secteur	Zone	Adulte Carpopapse (2 nd vol)	Pontes de Carpopapse (G2)	Eclosions de Carpopapse (G2)
Moyenne Vallée du Rhône (au 7 juin)	Zone précoce	99%	97%	90%
	Zone moyenne	97%	94%	90%
	Zone tardive	93%	89%	63%
Rhône-Loire (au 6 juillet)	Zone précoce	90%	83%	55%
	Zone moyenne	85%	71%	44%
	Zone tardive	79%	56%	27%
Savoie/Haute-Savoie au 7 juillet	Zone précoce	90 %	76%	57%
	Zone tardive	63 %	34%	7%

Modélisation – prévisions :

Secteur	Zone de précocité	CARPOCAPSE - PONTES Données prévisionnelles (modèle Ctifi/DGAL)														
		Juillet												Août		
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
MVR	ZP	risque modéré (G2)		98%		Risque nul										
	ZM	risque modéré (G2)								98%		Risque nul				
	ZT	risque modéré (G2)														
RL	ZP	risque modéré (G2)														
	ZM	risque fort (G2)		80%		risque modéré (G2)										
	ZT	risque fort (G2)								80%		risque modéré (G2)				
S-HS	ZP	risque fort (G2)				80%		risque modéré (G2)								
	ZT	risque fort (G2)												80%		risque modéré (G2)

Secteur	Zone de précocité	CARPOCAPSE - ECLOSIONS Données prévisionnelles (modèle Ctifi/DGAL)															
		Juillet												Août			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
MVR	ZP	risque modéré (G2)										98%		Risque nul			
	ZM	risque fort (G2)		80%		risque modéré (G2)											
	ZT	risque fort (G2)								80%		risque modéré (G2)					
RL	ZP	risque fort (G2)															
	ZM	risque fort (G2)										80%		risque modéré (G2)			
	ZT	risque fort (G2)															
S-HS	ZP	risque fort (G2)												80%		risque modéré (G2)	
	ZT	risque modéré (G1)						20%		risque fort (G2)							

Moyenne Vallée du Rhône : La période à haut risque de pontes de G2 est terminée en toutes zones. La période à haut risque d'éclosions de G2 est terminée en zones précoces. Elle se terminera en zones moyennes le 21 juillet et en zones tardives le 26 juillet.

Rhône-Loire : La période à haut risque de pontes de G2 est terminée en zones précoces. Elle se terminera le 22 juillet en zones moyennes et le 27 juillet en zones tardives. La période à haut risque d'éclosions de G2 est en cours en toutes zones. Elle se terminera le 26 juillet en zones précoces et le 30 juillet en zones tardives.

Savoie/Haute-Savoie : La période à haut risque de pontes de G2 est en cours en toutes zones. Elle s'achèvera le 23 juillet en zones précoces et le 1^{er} août en zones tardives. La période à haut risque d'éclosions de G2 est en cours en zones précoces. Elle débutera le 26 juillet en zones tardives.



Biocontrôle :

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Cf. Note de service DGAL/SDQSPV en cliquant sur le lien :

<http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-biocontr%C3%B4le-note-de-service>

La confusion doit être en place en tous secteurs. Cette technique permet d'empêcher la rencontre des mâles et des femelles par la diffusion d'un nuage de phéromones, et de limiter ainsi l'accouplement et la ponte.


Le virus de la granulose peut être utilisé au moment des éclosions pour empêcher le développement des larves (à positionner le soir, sensible aux UV).

• TORDEUSE ORIENTALE

Situation : Le deuxième vol de tordeuses se poursuit sur pommier et poirier avec des prises en augmentation.

Résultats des suivis de TORDEUSES ORIENTALES du 20/07/2026 sur pommier						
secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
Moyenne Vallée du Rhône	4	1	1	0	1	1
Rhône-Loire	7	3	3	0	0	1
Savoie/Haute-Savoie	2	2	0	0	0	0

Résultats des suivis de TORDEUSES ORIENTALES du 21/07/2026 sur poirier						
secteur	Nombre total de pièges suivis	Nombre pièges avec prises nulles	Nombre de pièges avec 1 à 5 captures	Nombre de pièges avec 6 à 10 captures	Nombre de pièges avec 11 à 20 captures	Nombre de pièges avec plus de 20 captures
Moyenne Vallée du Rhône	3	3	0	0	0	0
Savoie/Haute-Savoie	4	3	0	0	0	1



• MALADIES DE CONSERVATION

Les principaux champignons responsables de ces pathologies sont des parasites latents (champignons pénétrant dans les fruits par des portes d'entrée naturelles), ou des parasites de blessures.

Les parasites latents : Ces champignons pénètrent par les lenticelles, l'oeil, le pédoncule. Ils se développent après un temps de latence plus ou moins long. La contamination se fait essentiellement en verger à la faveur des pluies qui disséminent les spores.

- **Le Gloesporium** est présent sous forme de petits chancres sur les rameaux. Les spores sont disséminées à la surface des fruits sous l'action de la pluie et pénètrent dans les lenticelles. Sur fruits, ce champignon occasionne des pourritures brunes circulaires autour des lenticelles infectées.

- **Le chancre commun** (*Cylindrocarpon mali*) est la forme asexuée de *Nectria galligena*. Lorsqu'il existe des chancres dans le verger, les fruits peuvent être contaminés. Ce champignon entraîne une pourriture sèche au niveau de l'oeil en verger et une pourriture lenticellaire en conservation.

- **Le phytophthora** (*Phytophthora cactorum*) est un champignon qui se conserve dans le sol. Les fruits tombés ou ceux qui sont sur les branches basses sont les premiers à être contaminés. Il provoque une pourriture ferme, brune à contour diffus.

Les parasites de blessures : Ces champignons pénètrent dans les fruits par les portes d'entrée accidentelles et ont un développement rapide. La contamination peut se faire en verger, mais aussi dans les locaux de conservation.

- **La moniliose** (*Monilia fructigena*) se caractérise par une pourriture ferme brune qui se couvre rapidement de coussinets bruns disposés en cercles concentriques. Les fruits restent souvent accrochés dans l'arbre (fruits momifiés) et constituent une source de contamination.

- **Le botrytis de l'œil** (*Botrytis cinerea*) est un champignon à la fois parasite latent et de blessure. La contamination peut avoir lieu en fin de floraison et se maintenir à l'état latent dans les organes infectés. Les symptômes (petites lésions sèches brunes au niveau de la cavité oculaire) s'expriment en été. La contamination est également possible sur les fruits blessés. En conservation, la pourriture est brune, molle et se couvre d'un feutrage gris.

- **Le pénicillium** (*Penicillium expansum*) est une pourriture molle de forme circulaire et à contour net. Les fructifications apparaissent sous la forme d'une moisissure bleu-verdâtre. Ce champignon se conserve et se dissémine souvent à partir des palox.

Source : BSV Arboriculture Pommier Nord Poitou Charentes n°80 du 04/08/2015



Gleosporiose - photo CTIFL



Moniliose - photo FREDONRA



Botrytis de l'œil - photo <http://www.omafr.gov.on.ca>

Analyse de risque : Les maladies de conservation sont favorisées par un temps humide dans le mois précédent la récolte. Soyez vigilants au retour des orages et averses prévus en fin de semaine. Les blessures constituent des portes d'entrée.



Prophylaxie : Mettez en place des mesures prophylactiques à la récolte :

- Veillez à faire chuter et à retirer du verger les fruits atteints pour limiter les sources de contaminations.
- Manipulez avec précaution les fruits pour éviter les blessures au moment de la récolte et de la phase de conditionnement et trie à l'entrée en station.
- Supprimez tout ce qui peut entraîner des chocs lors de passages d'engins (rameaux longs).
- Éliminez les fruits trop près du sol (risque *phytophthora*).
- Évitez de cueillir en conditions pluvieuses.
- Utilisez des emballages propres.
- Ne laissez pas séjourner dehors les palox et caisses récoltées

• FEU BACTÉRIEN - *ERWINIA AMYLOVORA*

Cf. BSV n°18 du 30/06/2026




NOYER

• CARPOCAPSE

Le vol de deuxième génération est en cours avec parfois des prises importantes.

Modélisation :

Le modèle Inoki Carpopapse indique pour la station Chatte (Isère) au 20 juillet que 70 % du vol de deuxième génération des adultes, 49 % des pontes, et 8 % des éclosions ont été atteints. Pour la station Die, 66% du vol des adultes, 44 % des




pontes et 8 % des éclosions ont été atteints au 20 juillet


- **MOUCHE DU BROU – RHAGOLETIS COMPLETA**

Identification : L'adulte est identifiable par la présence d'un point jaune caractéristique du genre *Rhagoletis* en bas du thorax, ET des ailes transparentes marquées par 3 traits noirs épais, dont le dernier est prolongé en forme de L.

Attention à ne pas confondre l'insecte avec d'autres mouches du genre *Rhagoletis*, comme *Rhagoletis cerasi* (mouche de la cerise), *Rhagoletis meigenii* ou bien qu'elle n'ait pas encore été détectée en France : *Rhagoletis suavis*. En cas de détection de *Rhagoletis suavis*, contactez le SRAL Rhône-Alpes ou le réseau FREDON.



Rhagoletis completa
(mouche du brou de la noix)



Rhagoletis cerasi
(mouche de la cerise)



Rhagoletis suavis

Situation : La Mouche du Brou de la Noix fait l'objet d'un suivi de pièges. Au sein du réseau BSV, les premières captures ont été réalisées le 13 juillet. Hors réseau, le vol est en cours depuis le 29 juin.

- **BACTÉRIOSE**

Situation : la présence de dégâts a été signalé dans une parcelle le 20 juillet avec 1% des fruits touchés.

Analyse de risque : Des attaques secondaires sont possibles sur fruits à partir des feuilles tachées. La bactérie se multiplie activement lorsque l'humidité de l'air et l'humectation sont élevées et que les températures sont comprises entre 16 et 29°C. Soyez vigilants dans les parcelles présentant des symptômes, avec le retour des averses.

- **ANTRACNOSE DU NOYER – GNOMONIA LEPTOSTYLA**

Situation : la présence de la maladie a été signalée sur une parcelle avec 2% des feuilles touchées.

Analyse de risque : surveillez les prévisions météo (progression possible lors des averses du week-end).

- **GROS PUCERON DES NERVURES – Panaphis juglandis**

Situation : le 20 juillet, la présence de gros pucerons des nervures du noyer a été observée sur une parcelle avec 4% des arbres touchés.

CHÂTAIGNIER

- **PHÉNOLOGIE**

Le grossissement des bogues en cours sur tous les secteurs. Les fortes chaleurs peuvent bloquer le grossissement, en particulier sur des variétés très sensibles aux températures comme Bouche de Bétizac. Localement certains arbres commencent à souffrir de la sécheresse.

- **CHANCRE DU CHÂTAIGNIER - CRYPHONECTRIA PARASITICA**

Les conditions sèches et chaudes freinent le développement de nouveaux chancres, néanmoins il est important de surveiller et nettoyer les chancres qui se sont formés depuis le printemps.

• CYNIPS DU CHÂTAIGNIER - *DRYOCOSMUS KURIPHILUS*


Le vol du cynips est en cours. Néanmoins la lutte biologique par le *Torymus* est présente et devrait permettre une nouvelle régulation dans les années à venir.

• POURRITURES BRUNES DES FRUITS (DONT *GNOMONIOPSIS CASTANEA*)

Situation : avec le grossissement des bogues, le stade sensible à la contamination est passé. Le prochain stade de sensibilité (développement du champignon) sera avant récolte, en fonction des conditions climatiques et de chaleur à cette période.

• TORDEUSE DU CHÂTAIGNIER

Situation : vol en nette diminution, avec très peu de captures cette semaine. Début d'observation de dégâts sur bogues avec 1 à 3% de bogues atteintes sur certaines parcelles.



• CARPOCAPSE DU CHÂTAIGNIER – *CYDIA SPLENDANA*

Situation : Très peu de captures à ce jour sur les parcelles de références (1 capture sur l'ensemble des pièges). Le vol n'est globalement pas encore commencé.

• CARPOCAPSE DU GLAND – *CYDIA FAGIGLANDADA*

Situation : Ravageur observé localement, notamment sur les zones les plus chaudes (basse Ardèche) et sur le secteur de Vesseaux. Il peut être responsable de dégâts importants. Le vol est en cours avec des captures localement importantes (20/piège). Le cycle de ce ravageur est encore mal connu chez nous.



OLIVIER

Des observations seront réalisées dans la Drôme sur olivier cette année. Elles alimenteront le contenu des BSV Oléiculture rédigés en PACA. Retrouvez les bulletins avec le lien suivant :

<https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/bulletins-de-sante-du-vegetal-bsv-r267.html>



AGENDA

• COLLOQUE NATIONAL DEPHY ARBORICULTURE

Toutes espèces fruitières



Réseau
DEPHY

Stratégies phytos : où en
sommes-nous après 15
ans de défis ?

Innovations, difficultés et
réussites au verger



INSCRIPTION

Jeudi 3 décembre
Colloque national
DEPHY Arboriculture
à l'INRAE Avignon

Mercredi 2 décembre
Visites techniques

2/12
Visite technique
Pêche et abricot
Centre CTIFL
Balandran
+
producteurs
DEPHY

2/12
Visite technique
Pomme et poire
Station La Pugère
+
producteurs
DEPHY

2/12
Visite technique
Cerise
Antenne CTIFL
La Tapy
+
vergers

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

GOUVERNEMENT
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche
Région Auvergne-Rhône-Alpes



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos



Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée.
<http://arboriculture.ecophytopic.fr/arboriculture>

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Michel Joux, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine Vaure – perrine.vaure@aura.chambagri.fr

Animateur filière/Rédacteur : Anne-Lise CHAUSSABEL - anne-lise.chaussabel@drome.chambagri.fr / Tony COUANON – tony.couanon@fredon-aura.fr

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture de la Drôme, de l'Ardèche, du Rhône, de l'Isère, Cooptain, Syndicat des Producteurs de Fruits de Savoie, Jean-Pierre Klein, Ets Bernard, Experenn, Vignolis, Groupe Oxyane, Lorifruit, FREDON Auvergne-Rhône-Alpes, ADABIO, Verger Expérimental de Poisy, Coopénoix, SICA Noix, SENURA, SICOLY, Cerifrais, Rhodacoop, Arthropologia

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tout autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

