

Végétaux d'ornement ou forestiers

Rosa

OQP

Popilla japonica / Scarabée japonais

Scarabée polyphage de 10 à 12mm. Il présente 5 touffes latérales de soies blanches et deux touffes sur le dernier segment abdominal.



Racines : Larves

Feuilles : Limbe rongé en forme de dentelle.

Période optimale : Juin à septembre

Hôtes à surveiller : Tous les prunus

Photographie 1 : Matthew Beziat / FLICKR, Japanese Beetle Adult: Ohio State University,



OQ

Aleurocanthus spiniferus / Aleurode épineux du citronnier

Insecte présent sur de nombreuses espèces végétales.



Feuilles : Déformation – Pupariums noirs avec des épines sur la face inférieure de la feuille

Période optimale : De juin à septembre

Hôtes à surveiller : Rosa et Crataegus

Photographies : 2. Puparium d'*Aleurocanthus spiniferus* sous une feuille de Citrus © Cioffi et al., 2013
3. Adulte d'*Aleurocanthus spiniferus* © Elena Regina - Flickr



OQ

Rose Rosette Virus / *Phylloxera fructiphilus*

Ce virus est transmis par le Phylloxera fructiphilus.



Feuilles : Rougissement et prolifération de feuilles

Rameaux : Prolifération d'épines.

Fleur : Décoloration

Hôtes à surveiller : Rosa

Photographies : 4. Symptôme du balai de sorcière. © Alan Windham University of Tennessee



Si vous observez un OQP ou OQ, contactez le SRAL sans délai