

juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

TYPE 0		marcs de raisin, composts de déchets verts		toutes intercultures											
TYPE I	fumier compact sans écoulement et composts d'effluents d'élevage (sauf composts de fientes)	intercultures longues	CINE détruit ou CIE exportée l'année suivante	[Green]											
			CINE détruit avant la fin de l'année et non suivi d'une culture implantée dans l'année	possible jusqu'à 20j avant la destruction de la CINE				[Red]				possible jusqu'à 20j avant la destruction de la CINE			
			CIE exporté avant la fin de l'année et non suivi d'une culture implantée dans l'année	possible jusqu'à 20j avant la destruction de la CIE				[Red]				possible jusqu'à 20j avant la destruction de la CIE			
		intercultures courtes	CINE détruit avant la fin de l'année et suivi d'une culture implantée dans l'année	[Green]											
			CIE exporté avant la fin de l'année et suivi d'une culture implantée dans l'année	[Green]											
		fumier de raclage et autres effluents à C/N>8 et ISMO>50%	intercultures longues	CINE détruit ou CIE exportée l'année suivante	[Green]										
	CINE détruit avant la fin de l'année et non suivi d'une culture implantée dans l'année			possible à partir de 15j avant l'implantation jusqu'à 20j avant la destruction de la CINE				[Red]				possible à partir de 15j avant l'implantation jusqu'à 20j avant la destruction de la CINE			
	CIE exporté avant la fin de l'année et non suivi d'une culture implantée dans l'année			possible à partir de 15j avant l'implantation jusqu'à 20j avant la destruction de la CIE				[Red]				possible à partir de 15j avant l'implantation jusqu'à 20j avant la destruction de la CIE			
	intercultures courtes		CINE détruit avant la fin de l'année et suivi d'une culture implantée dans l'année	[Green]											
		CIE exporté avant la fin de l'année et suivi d'une culture implantée dans l'année	[Green]												
TYPE II	fumier de volailles, lisiers, fientes, digestats de méthaniseurs et autres effluents à C/N<8	intercultures longues	CINE détruit ou CIE exportée l'année suivante	[Green]											
			CINE détruit avant la fin de l'année et non suivi d'une culture implantée dans l'année	possible à partir de 15j avant l'implantation				[Red]				possible jusqu'à 20j avant la destruction de la CINE			
			CIE exporté avant la fin de l'année et non suivi d'une culture implantée dans l'année	possible à partir de 15j avant l'implantation				[Red]				possible jusqu'à 20j avant la destruction de la CINE			
		intercultures courtes	CINE détruit avant la fin de l'année et suivi d'une culture implantée dans l'année	[Green]											
			CIE exporté avant la fin de l'année et suivi d'une culture implantée dans l'année	[Green]											
		TYPE III	engrais azotés	intercultures longues	CIE exportée l'année suivante	apport possible entre le semis et les 15j suivant le semis				[Red]				[Green]	
CINE	pas d'apport sur CINE														
CIE exporté avant la fin de l'année et non suivi d'une culture implantée dans l'année	apport possible entre le semis et les 15j suivant le semis				[Red]				sans objet						
intercultures courtes	CINE			pas d'apport sur CINE											
	CIE exporté avant la fin de l'année et suivi d'une culture implantée dans l'année			apport possible entre le semis et les 15j suivant le semis				[Red]				sans objet			